مثال :



الشكل يمثل قطع ناقص معادلته

$٤س^{٢} + ٣ص^{٢} = ٤٨$

جد طول $\overline{أب}$

الحل : ميل الخط المستقيم = ظا الزاوية مع محور السينات

ميل $\overline{أب}$ = ظا ٣٠

ميل $\overline{أب} = \frac{١}{\sqrt{٣}}$

معادلة $\overline{أب}$ وهو يمر بالنقطة (٠،٠)

الميل $\frac{١}{\sqrt{٣}}$ مع

$ص - ص_{١} = م(س - س_{١})$

$ص - ٠ = \frac{١}{\sqrt{٣}}(س - ٠)$

المعادلة هي $\boxed{ص = \frac{١}{\sqrt{٣}} س}$ ← (١)

لتعيين ص نعوضها في معادلة القطع

$٤س^{٢} + ٣(\frac{١}{\sqrt{٣}} س)^{٢} = ٤٨$

$٤س^{٢} + ٣ \times \frac{س^{٢}}{٣} = ٤٨$

$٣ س^{٢} + س^{٢} = ٤٨$

$س^{٢} = ٣٦ \Leftarrow ٤س^{٢} = ١٤٤$

$س = \pm ٦ \Leftarrow$ نعوضها في (١) $ص = \frac{١}{\sqrt{٣}} \times \pm ٦$

$ص = \pm ٢\sqrt{٣}$

$ب = (٦، ٢\sqrt{٣})$ ، $أ = (-٦، -٢\sqrt{٣})$

المسافة بين نقطتين

$أب = \sqrt{(س_{٢} - س_{١})^{٢} + (ص_{٢} - ص_{١})^{٢}}$

$أب = \sqrt{(٦ + ٦)^{٢} + (٢\sqrt{٣} + ٢\sqrt{٣})^{٢}}$

$= \sqrt{١٢^{٢} + ٤\sqrt{٣}^{٢}}$

$= \sqrt{١٤٤ + ٤٨} = \sqrt{١٩٢}$

مثال قطع ناقص معادلته

$\frac{س^{٢}}{أ^{٢}} + \frac{ص^{٢}}{\frac{٣}{٤} أ^{٢}} = ١$ اثبت أنه

مع هذا القطع يكون البعد البؤري مساوياً لنصف البعد بين الرأسين

الحل : $جـ^{٢} = أ^{٢} - ب^{٢} = أ^{٢} - \frac{٣}{٤} أ^{٢}$

$جـ^{٢} = \frac{١}{٤} أ^{٢} \Leftarrow جـ = \frac{١}{٢} أ$

$أ = ٢جـ \Leftarrow$

البعد بين الرأسين = $٢أ$

البعد بين البؤرتين $٢جـ$

$٢أ = ٢(٢جـ)$

$٢أ = ٤جـ$ البعد بين البؤرتين $\times ٢$

مثال: $ك س^2 + 5 ص^2 = 17$ تمثل معادلة قطع ناقص اثبت أن $ك = \frac{17}{أ^2 + ب^2}$

الحل: $ك س^2 + 5 ص^2 = 17 \div 17$

$$\frac{ك س^2}{17} + \frac{5 ص^2}{17} = 1$$

$$\frac{س^2}{\frac{17}{ك}} + \frac{ص^2}{\frac{17}{5}} = 1$$

$\Leftarrow أ^2 = \frac{17}{ك} \Leftarrow ك = \frac{17}{أ^2}$

$ب^2 = أ^2 - ج^2 \Leftarrow أ^2 = ب^2 + ج^2$

$ك = \frac{17}{ب^2 + ج^2}$

مثال: جد حقوس على شكل نصف قطع ناقص طول قاعدته الاقصى ١٠٠ م واقصى ارتفاع ٣٠ م او جد ارتفاع الجسر على بعد ١٠ م من حرف القاعده

الحل:



قطع ناقص $\frac{س^2}{أ^2} + \frac{ص^2}{ب^2} = 1$

$أ^2 = 100 \Leftarrow أ = 50 \Leftarrow أ^2 = 2500$

$ب = 30 \Leftarrow ب^2 = 900$

المعادلة $\frac{س^2}{2500} + \frac{ص^2}{900} = 1$

النقطة $(١٠، ص)$ تحقق $\Leftarrow$

$\frac{100}{2500} + \frac{ص^2}{900} = 1 \Leftarrow \frac{ص^2}{900} = 1 - \frac{1}{25} = \frac{24}{25}$

$ص^2 = \frac{24}{25} \times 900 = 864 \Leftarrow ص = 24\sqrt{6}$

مثال: ١٠



٦

الشكل يمثل قطع ناقص داخل مستطيل جد مساحة المنطقة المظلله

الحل: $أ^2 = 10 \Leftarrow أ = 5$

$ب^2 = 6 \Leftarrow ب = 3$

مساحة القطع $= \pi أ ب$

$= \pi \times 5 \times 3 = 15\pi$

مساحة المستطيل $= 10 \times 6 = 60$

مساحة المنطقة المظلله $= 60 - 15\pi$

مثال: $\frac{س^2}{ل - 3} + \frac{ص^2}{ل - 5} = 1$

اوجد مدى ل التي تجعل المعادله تمثل قطع ناقص

الحل: في القطع الناقص

معامل $س^2 > 0$ ، معامل $ص^2 > 0$

$ل - 3 > 0 \Leftarrow ل > 3$

$5 - ل > 0 \quad ل < 5$

منطقة التقاطع



العدد $(٣، ٥)$ محذوف اي يحذف عليه من المقام فتصبح

مثال: تتحرك نقطة في المستوى الإحداثي و (س ، ص) حيث أن

$س = 5 + 3جتا\theta$ ، $ص = -2 + 4جا\theta$

حيث θ زاوية متغيرة فما معادلة المحل الهندسي للنقطة و (س ، ص) و حدد نوعه

الحل: $س - 5 = 3جتا\theta$

$\therefore جتا\theta = \frac{س-5}{3}$ (1)

$جا\theta = \frac{(س-5)}{9}$

$ص + 2 = 4جا\theta$

$جا\theta = \frac{(ص+2)}{4}$

$جا^2\theta = \frac{(ص+2)^2}{16}$

$جتا^2\theta + جا^2\theta = 1$

$\frac{(س-5)^2}{9} + \frac{(ص+2)^2}{16} = 1$

قطع ناقص رأسي

مثال: تتحرك النقطة و (س ، ص) في المستوى حيث أن $س = p(جتا\theta - جا\theta)$

$ص = p(جتا\theta + جا\theta)$

اثبت أن المعادلة الديكارتية هي قطع ناقص

الحل: $\frac{س}{p} = جتا\theta - جا\theta$ (2) بالتربيع

$\frac{س^2}{p^2} = (جتا\theta - جا\theta)^2$

$\frac{س^2}{p^2} = جتا^2\theta - 2جا\theta جتا\theta + جا^2\theta$

$\frac{س^2}{p^2} = 1 - 2جا\theta جتا\theta$ (1)

$\frac{ص}{p} = جتا\theta + جا\theta$ (2) بالتربيع

$\frac{ص^2}{p^2} = (جتا\theta + جا\theta)^2$

$\frac{ص^2}{p^2} = جتا^2\theta + 2جا\theta جتا\theta + جا^2\theta$

$\frac{ص^2}{p^2} = 1 + 2جا\theta جتا\theta$ (3)

اجمع 1 + 2 اضرب $\frac{1}{2}$ اطرح 3

$\frac{س^2}{2p^2} + \frac{ص^2}{2p^2} = 2$

$\frac{س^2}{4p^2} + \frac{ص^2}{4p^2} = 1$

مثال: م، ن نقطتان مادتان، النقطه م تدور حول قطع ناقص والنقطه ن في احدى بؤرتي هذا القطع فاذا كان طول المحور الاكبر يساوي ١٠ والاختلاف المركزي ٠,٣ اوجد

① اقصر مسافه بين النقطتين م و ن

② اطول مسافه بين النقطتين م و ن

الحل: $2a = 10 \Leftarrow a = 5$

$e = \frac{ج}{a} \Leftarrow \frac{3}{10} = \frac{ج}{5}$

$\Leftarrow ج = 1,5$

اقصر مسافه بين نقطه على محيط القطع الناقص والبؤره هي $a - ج$

$= 5 - 1,5 = 3,5$

اطول مسافه بين نقطه على محيط القطع الناقص والبؤره هي $a + ج$

$= 5 + 1,5 = 6,5$

مثال: اوجد معادلة القطع الناقص الذي بؤرتاه $ب_1(-2, 17)$، $ب_2(-2, 5)$ وقيمه محيط المثلث $ب_1 ب_2 ب_3 = 36$ حيث $ب_3$ نقطه على القطع الناقص

الحل:

القطع رباعي



$$\frac{(س - ى)^2}{ب^2} + \frac{(ص - ه)^2}{a^2} = 1$$

او

$$\frac{(ص - ه)^2}{a^2} + \frac{(س - ى)^2}{ب^2} = 1$$

المركز بوسط البؤرتين

$(ى, ه) = \left(\frac{-2-2}{2}, \frac{17+5}{2}\right) = (-2, 11)$

$ج = 17 - 11 = 6$

$ج^2 = a^2 - ب^2 \Leftarrow 36 = 144 - ب^2$

$\Leftarrow ب^2 = 108$

$\frac{(س + 2)^2}{108} + \frac{(ص - 11)^2}{144} = 1$

محيط المثلث $ب_1 ب_2 ب_3 = 2a + 2ج$

$36 = 24 + 2ج \Leftarrow ج = 6$

$a = 12 \Leftarrow a^2 = 144$

مثال :

من القطع الناقص السابق أن

$جـ^2 = أ^2 - ب^2$



من تعريف القطع الناقص

$ن ب_1 + ن ب_2 = 2أ$

$\sqrt{(-جـ)^2 + (ب-٠)^2} + \sqrt{(٠+جـ)^2 + (ب-٠)^2} = 2أ$

$= \sqrt{جـ^2 + ب^2} + \sqrt{جـ^2 + ب^2} = 2أ$

$2\sqrt{جـ^2 + ب^2} = 2أ$

$= أ = \sqrt{جـ^2 + ب^2}$ بربع الطرفين

$أ^2 = جـ^2 + ب^2$

$جـ^2 = أ^2 - ب^2$

مثال : جد معادلة القطع الناقص الذي بؤرتاه $(\pm ٣، ٠)$ ويتقاطع مع محور السينات عند $س = \pm ٥$



تقاطع المنحنى مع محور السينات عند $س = \pm ٥$

يمثل رأسي القطع

المركز = $(٠، ٠)$

الرأسان $(\pm ٥، ٠)$

$أ = ٥$ المسافة من المركز للرأس

$جـ = ٣$ المسافة من المركز للبؤرة

$جـ^2 = أ^2 - ب^2$

$٩ = ٢٥ - ب^2 \leftarrow ب^2 = ١٦$

القطع من

$\frac{س^2}{٢٥} + \frac{ص^2}{١٦} = ١$

مثال: جد معادلة القطع المخروطي الذي مركزه نقطة الاصل وطول محوره الاصغر ٦ وحدات واختلافه المركزي $\frac{1}{2}$

الحل: $\because$ هـ $= \frac{1}{2} < 1$ قطع ناقص

$\because$ ب $= 2$ جـ $\Leftarrow$ ب $= \sqrt{3}$ جـ

هـ $= \frac{\text{جـ}}{\text{أ}} = \frac{1}{2} \Leftarrow$ أ $= 2$ جـ ①

جـ^2 $=$ أ^2 $-$ ب^2

جـ^2 $= (2\text{جـ})^2 - (\sqrt{3}\text{جـ})^2$

جـ^2 $= 4$جـ^2 $- 3$جـ^2

-2جـ^2 $= -3$جـ^2

جـ^2 $= 9$

جـ $= \pm 3$ وبما أن ①

أ $= 2 \times 3 = 6$ $\Leftarrow$ أ $= 6$

لا تنطبق القيمتان لان القطع سيني او صادي لذلك هنالك حالتان

① $\frac{\text{س}^2}{36} + \frac{\text{ص}^2}{27} = 1$

② $\frac{\text{س}^2}{27} + \frac{\text{ص}^2}{36} = 1$

مثال: جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه $(0,0)$ ومحوره الاكبر يقع على محور السينات حيث ان بعد الرأس عن البؤرة القريبة $= \frac{1}{2}$ وبعده عن البؤرة البعيدة $= 5$

الحل: القطع سيني

$\frac{\text{س}^2}{\text{أ}^2} + \frac{\text{ص}^2}{\text{ب}^2} = 1$

أ $-$ جـ $= 1$ ① $\Leftarrow$ بعد الرأس عن القريبة



بعد البؤرة للمركز $=$ جـ

وبعد المركز الى الرأس $=$ أ

بعد البؤرة الى الرأس

$=$ بعد البؤرة للمركز + بعد المركز للرأس

② $5 = 1 + $ جـ

بحل المعادلتين $\Leftarrow$ أ $= 3$ $\Leftarrow$ جـ $= 2$

ب^2 $=$ أ^2 $-$ جـ^2 $\Leftarrow$ ب^2 $= 9 - 4$

ب^2 $= 5$

المعادلة $\frac{\text{س}^2}{9} + \frac{\text{ص}^2}{5} = 1$

مثال: جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وبعد بؤرته (١، ٣) واختلافه المركزي $\frac{2}{3}$ ومحوره الأكبر يقع على محور السينات

الحل: $\because$ هـ $= \frac{2}{3}$ < ١

$$\frac{س'^2}{أ'^2} + \frac{ص'^2}{ب'^2} = ١$$

بعد بالنقطة (١، ٣)

$$(\frac{١}{أ'^2} + \frac{٩}{ب'^2} = ١) \quad أ'^2 ب'^2$$

$$ب'^2 + ٩أ'^2 = أ'^2 ب'^2 \leftarrow (١)$$

$$هـ = \frac{جـ}{أ} = \frac{2}{3} \Leftarrow ٣جـ = ٢أ$$

$$\Leftarrow \boxed{جـ = \frac{2}{3} أ}$$

$$جـ'^2 = أ'^2 - ب'^2$$

$$(\frac{2}{3} أ)^2 = أ'^2 - ب'^2$$

$$\frac{٤}{٩} أ'^2 = أ'^2 - ب'^2 \Leftarrow ب'^2 = أ'^2 - \frac{٤ أ'^2}{٩} = \frac{٩ أ'^2 - ٤ أ'^2}{٩}$$

$$ب'^2 = \frac{٥ أ'^2}{٩} \Leftarrow -ب'^2 = \frac{-٥ أ'^2}{٩}$$

بالتعويض في (١) ②

$$\frac{٥}{٩} أ'^2 + ٩أ'^2 = أ'^2 \times أ'^2$$

$$\frac{٤١}{٩} أ'^4 = \frac{٥}{٩} أ'^4$$

$$\Leftarrow أ'^2 = \frac{٤١}{٥}$$

بالتعويض في ②

$$ب'^2 = \frac{٥}{٩} \times \frac{٤١}{٥}$$

$$\boxed{ب'^2 = \frac{٤١}{٩}}$$

المعادلة هي

$$\frac{س'^2}{\frac{٤١}{٥}} + \frac{ص'^2}{\frac{٤١}{٩}} = ١$$

$$\frac{٥ س'^2}{٤١} + \frac{٩ ص'^2}{٤١} = ١$$

$$\frac{٤١ أ'^2}{٩} \cdot \frac{٥}{٩} أ'^2 = ٠$$

$$\frac{١}{٩} أ'^2 (٤١ - ٥ أ'^2) = ٠$$

$$أ'^2 = ٠ \Leftarrow أ = ٠$$ مرفوض لأن

$$٥ أ'^2 = ٤١ \Leftarrow \boxed{أ'^2 = \frac{٤١}{٥}}$$

وعوض في ②

mq 0795598456

مثال : اذا كانت $ب_1 = (-3, 0)$

$ب_2 = (3, 0)$ والنقطة $ن(س, ص)$

تتحرك في المستوى بحيث ان

$ن ب_1 + ن ب_2 = 10$ اكتب

معادلة المحل الهندسي للنقطة ن

الحل :



$ن ب_1 + ن ب_2 = 10 = 2أ$ ⇐ $أ = 5$

$ب_1, ب_2$ هما البؤرتان المسافة

بينهما $= 6 = 2جـ$ ⇐ $جـ = 3$

المركز منتصف البؤرتين $(0, 0)$ صفر

$ب_2 = أ^2 - ب^2$ ⇐ $9 = 25 - ب^2$

$ب^2 = 16$

$\frac{س^2}{25} + \frac{ص^2}{16} = 1$

مثال : اوجد معادلة القطع الناقص الذي

مركزه $(2, 3)$ وبؤرتاه $(2, 11)(2, 5)$

وطول محوره الاكبر $= 6$ أمثال البعد البؤري



القطع سيني $\frac{(س - د)^2}{أ^2} + \frac{(ص - هـ)^2}{ب^2} = 1$

$2جـ = 5 - 1 = 4$ ⇐ $جـ = 2$

$جـ^2 = 4$

المحور الاكبر $= 6 \times 2جـ$

$2أ = 12$

$أ = 6$ ⇐ $أ = 12$

$جـ^2 = أ^2 - ب^2$

$4 = 144 - ب^2$ ⇐ $ب^2 = 140$

$\frac{(س - 3)^2}{144} + \frac{(ص - 2)^2}{140} = 1$

مثال :

قطع مخروطي اختلافه المركزي $\frac{2}{3}$ ورأسه $(3,1)$ والبؤرة المقابلة لهذا الرأس هي $(1,1)$ عين معادلته

الحل :



$$\frac{(س-د)^2}{ب^2} + \frac{(ص-هـ)^2}{ب^2} = 1$$

بعد الرأس عن البؤرة المقابلة

$$ا - جـ = 3 - 1$$

$$ا - جـ = 2 \quad (1)$$

$$\frac{ا}{جـ} = \frac{3}{2} \Leftarrow 2ا = 3جـ$$

$$ا = \frac{3}{2} جـ$$ بالتعويض في (1)

$$\frac{1}{2} جـ - جـ = 2$$

$$-\frac{1}{2} جـ = 2 \Leftarrow جـ = 4$$

بالتعويض في (1) $\Leftarrow$

$$ا - 4 = 2 \Leftarrow ا = 6$$

$$ب^2 = ا^2 - جـ^2$$

$$ب^2 = 36 - 16 \Leftarrow ب^2 = 20$$

مركز القطع $(د + جـ ، هـ)$

$$(د + 4 ، 1)$$

$$د + 4 = 1$$

$$د = -3$$ مركز $(-3 ، 1)$

مثال : اذا كان البعد بين بؤرتي قطع ناقص يساوي نصف البعد بين طرفي محوره الاكبر والاصغر فما قيمة الاختلاف المركزي



$$جـ = \frac{1}{2} ف \Leftarrow ف = 4جـ$$

بما عدرس

$$ف^2 = ب^2 + ا^2 \Leftarrow$$

$$(4جـ)^2 = ب^2 + ا^2$$

$$16جـ^2 = ب^2 + ا^2$$

$$ا^2 + ب^2 = 16جـ^2$$ ربع

$$ا^2 - جـ^2 = ب^2$$ قاعدة

$$16جـ^2 = ا^2 + ب^2$$

$$+ \quad 2ا^2 = 17جـ^2$$

$$ا^2 = \frac{17}{2} جـ^2 \Leftarrow جـ = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{17}} ا$$

$$هـ = \frac{جـ}{ا} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{17}} ا}{ا} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{17}}$$

mq 0795598456
mq 0795598456



اقصر مسافه بين نقطه تقع على محيط القطع الناقص والبؤره

هي م - جـ

mq
0795598456

اطول مسافه بين نقطه على محيط القطع الناقص والبؤره

هي م + جـ

مثال على سؤال القمر والارض

العمر على القطع الناقص والارض عند البؤره

اثبت ان الاختلاف المركزي = $\frac{م-ن}{م+ن}$

بين ان اطول مسافه بين الارض والقمر = ٢م

واقصر مسافه ن



الحل: م + ن = ٢أ

م - ن = ٢جـ

أ = $\frac{م+ن}{٢}$ ، جـ = $\frac{م-ن}{٢}$

هـ = $\frac{جـ}{أ}$ = $\frac{\frac{م-ن}{٢}}{\frac{م+ن}{٢}}$ = $\frac{م-ن}{م+ن}$

ملاحظات على القطع الناقص



ن ب١ + ن ب٢ = ٢ P

محيط المثلث ن ب١ ب٢ = ٢ P + ٢ جـ

* الرأسين والبؤرتين تقعان على المحور الأكبر دائماً .

* P = بعد الرأس عن المركز

* ب = بعد طرف المحور الأصغر عن المركز

* جـ = بعد البؤرة عن المركز

* طول المحور الأكبر = ٢ P

* طول المحور الأصغر = ٢ ب

* البعد البؤري = ٢ جـ

وهو المسافة بين البؤرتين

* الاختلاف المركزي هـ = $\frac{جـ}{P}$ ، ١

لأن جـ < P

* معادلة المحور الأكبر تعاكس معادلة المحور الأصغر

* P > ب

$$جـ^2 = P^2 - ب^2$$

* بعد الرأس عن البؤرة القريبة منه هو (P - جـ) وهو يمثل أقصر مسافة بين النقطة ن (س، ص) والبؤرة

* المركز ينصف البؤرتين

* المركز ينصف الرأسين

* المركز ينصف طرفي المحور الأصغر

* نجد المركز حسب القاعدة

منتصف قطعة مستقيمة هو

$$\left(\frac{س_1 + س_2}{2} ، \frac{ص_1 + ص_2}{2}\right)$$

* الدائرة حالة خاصة من القطع الناقص عندما P = ب تكون الدائرة قطع ناقص طول محوره الأكبر = طول محوره الأصغر



فيثاغورس $P^2 = ب^2 + جـ^2 \Leftarrow جـ^2 = P^2 - ب^2$

* مساحة القطع الناقص هي

π P ب

* تقاطع المحور الأكبر مع منحنى القطع عند

س = عدد ⇐ تشكل نقطة الرأس



mg 0795598456

تمارين وزارية سنوية ٢٠١٤

لمعادلة القطع الناقص $\frac{(س-ل)^2}{ب^2} + \frac{(ص-ك)^2}{ب^2} = 1$

اثبت ان $ب^2 = ب^2 (1 - هـ^2)$ حيث هـ الاختلاف المركزي

الحل: $هـ = \frac{جـ}{ب} \Leftarrow جـ = هـ ب$

$جـ^2 = هـ^2 ب^2$

$جـ^2 = ب^2 - ب^2$

$ب^2 - ب^2 = هـ^2 ب^2$

$\Leftarrow ب^2 = ب^2 - هـ^2 ب^2$

$= ب^2 (1 - هـ^2)$

(١١) يدور القمر حول الارض في مدار على شكل قطع ناقص حيث تقع الارض في احد بؤرتي المدار اذا كانت اطول مسافة بين الارض والقمر تساوي م كم واقصر مسافة بينهما ن كم كما في الشكل اثبت ان الاختلاف المركزي لمداره يساوي $\frac{م-ن}{م+ن}$



الحل: $ن = ب - جـ$

$ب + جـ = م$

$ب + ن = م$

بالجمع $ب = \frac{ن + م}{2}$

$جـ = ب - ن \Leftarrow جـ = \frac{م - ن}{2}$

$هـ = \frac{جـ}{ب} = \frac{\frac{م-ن}{2}}{\frac{م+ن}{2}} = \frac{م-ن}{م+ن}$

(٤٤)

س٨ جد طول نصف قطر الدائرة التي معادلتها تساوي مساحة القطع الناقص $\frac{س^2}{81} + \frac{ص^2}{16} = 1$

الحل: $أ = 9$ ، $ب = 4$

مساحة القطع الناقص $= \pi أ ب \Leftarrow \pi \times 9 \times 4 = 36\pi$

مساحة الدائرة $= \pi نق^2 = 36\pi$

$نق^2 = 36 \Leftarrow \pi نق^2 = 36\pi$

$نق = 6$

س٩ دائرة مركزها $(14، 0)$

تمثل الشكل دائرة وقطع ناقص متمركزين في المركز $(0، 0)$ إذا كانت مساحة القطع الناقص تساوي مثلي مساحة الدائرة المرسومة داخله

جد ① الاختلاف المركزي للقطع الناقص

② معادلة القطع الناقص



الحل: مساحة القطع $= 2 \times$ مساحة الدائرة

$\pi أ ب = 2 \pi نق^2$

$أ ب = 2 \times 100 \Leftarrow أ ب = 200 \Leftarrow ب = 10$

$أ = 10 \times أ \Leftarrow 200 = 100$

$\boxed{أ = 20}$

$جـ^2 = أ^2 - ب^2 \Leftarrow جـ^2 = 400 - 100 = 300 \Leftarrow جـ = \sqrt{300} = 10\sqrt{3}$

① $هـ = \frac{جـ}{أ} = \frac{\sqrt{300}}{20} = \frac{10\sqrt{3}}{20} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

② $\frac{س^2}{400} + \frac{ص^2}{100} = 1$

س٦ تتحرك النقطة و(س، ص) حيث تحدد موضعها المعادلتين

س = ٥ + ٣ جا هـ ، ص = ٢ + ٤ جتا هـ بين أن النقطة و تتحرك على محيط قطع ناقص ثم حدد معادلته البؤرية

الحل :

س = ٥ + ٣ جا هـ	ص = ٢ + ٤ جتا هـ
٣ جا هـ = س − ٥	٤ جتا هـ = ص − ٢
جا هـ = (س − ٥)/٣	جتا هـ = (ص − ٢)/٤
جا² هـ = (س − ٥)²/٩	جتا² هـ = (ص − ٢)²/١٦

جا² هـ + جتا² هـ = ١

(س − ٥)²/٩ + (ص − ٢)²/١٦ = ١

قطع ناقص حيث أ² = ١٦ ، ب² = ٩ ، جـ² = أ² − ب²

جـ² = ٧ ⇐ جـ = ٥ = √٧

البعد البؤري = ٢ جـ = ٢√٧

س/ وزارة ٢٠١٠ شتوية

قطع ناقص مساحته ٤٠π ورأساه (±١٨، ٠) فما معادلته

مساحة القطع الناقص = π أ ب = ٤٠π ⇐ أ ب = ٤٠

مدار القطع الناقص = (٨ + −٨)/٢ ، ٠ = (٠، ٠) = ٨ = أ

٨ × ب = ٤٠ ⇐ ب = ٥

معادلة القطع الناقص س²/٦٤ + ص²/٢٥ = ١

(٢٢)

س ٦ ج

السؤال الرابع

المعادلة القطع الناقص مركزه (١،١) واحدى بؤرتيه هي بؤرة القطع المكافئ $(ص-١)^{٢}-١٢س=٠$ وطول محوره الاصغر = ٦ وحدات

الحل: البداية من القطع المكافئ

$(ص-١)^{٢}=١٢س$ ، $٤ج=١٢ \Leftarrow ج=٣$

الرأس $(٠،١)$ ، $\Leftarrow$ البؤرة $=(٣+٠،١)=(٣،١)$

بؤرة القطع الناقص هي $(٢،١)$

طول الاصغر $=٢ب=١٠ \Leftarrow \boxed{ب=٥}$

القطع ستر لان القطع الصادر في المركز والبؤرة تابعين لقطع

$ج=٣-١=٢$

$ج^{٢}=أ^{٢}-ب^{٢} \Leftarrow أ^{٢}=٤+٥=٩ \Leftarrow \boxed{أ^{٢}=٩}$

$$\frac{(س-١)^{٢}}{٩}+\frac{(ص-١)^{٢}}{٢٥}=١$$

س/ قطع ناقص بؤرتاه $(٤،٠)$ $(-٤،٠)$ ن $(س،ص)$ تقع على محيط القطع حيث ان محيط المثلث ن ب١ ب٢ = ٢٤ جد معادلته

ن ب١ + ن ب٢ = ٢ أ = ٢٤

$\Leftarrow$ أ = ١٢



من تعريف القطع الناقص للنقطة ن $(س،ص)$ المتحركة في المستوى بحيث يكون مجموع بعديها عن نقطتين ثابتتين ب١، ب٢ يساوي مقدارا ثابتا

$ج=٤ \Leftarrow ٢ج=٨$

$ب^{٢}=أ^{٢}-ج^{٢} \Leftarrow ب^{٢}=١٤٤-١٦=١٢٨$

المركز منتصف المسافة بين البؤرتين $\left(\frac{٤+(-٤)}{٢}، \frac{٠+٠}{٢}\right)=(٠،٠)$ القطع حيث

$$\frac{س^{٢}}{١٤٤}+\frac{ص^{٢}}{١٢٨}=١$$

(٣)

(٢١)

السؤال الثالث وزاره شتوية ٢٠١٠

٣٥٨

جد معادلة القطع الناقص الذي احدى بؤرتيه مركز الدائرة التي معادلتها

$(س-٦)^{٢} + (ص-٤)^{٢} = ٣٦$ وطول محوره الاصغر

مساوي لطول قطر هذه الدائرة ومعادلة محوره الاصغر $س = -١$

الكل $\frac{(س-٣)^{٢}}{٤} + \frac{(ص-٢)^{٢}}{٩} = ٣٦$

$٤(س-٣)^{٢} + ٩(ص-٢)^{٢} = ٣٦$

$(س-٣)^{٢} = (ص-٢)^{٢} = ٩ \leftarrow د = ٩ \Leftarrow ر = ٣ =$ نصف القطر

مركز الدائرة = احدى البؤرتين $(٣، ٢)$

قطر الدائرة $= ٢ب = ٦ \Leftarrow ب = ٣$

المركز يقع على المحور الاصغر الذي معادلته $س = -١$ مركز $(-١، ٢)$

$ج = \sqrt{ب^{٢} - أ^{٢}} = \sqrt{٣٢ - ١١} = \sqrt{٤} = ٢$

البؤرة والمركز يقعان على نفس المحور

بؤرة $(٣، ٢)$

القطع سيني $\Leftarrow$ محوره $= ٢$

المركز $(-١، ٢)$

$ج^{٢} = ب^{٢} - أ^{٢}$

$١٦ = ب^{٢} - ٩ \Leftarrow ب^{٢} = ٢٥$

$\frac{(س+١)^{٢}}{٢٥} + \frac{(ص-٢)^{٢}}{٩} = ١$

(هـ) جد معادلة القطع وزاره حسب ١١.ج

$(جـ ص + ٤)^{٢} + (٣ - س)^{٢} = ٣٦$

الحل: $(جـ (ص + ٢) - ١)^{٢} + (-١ (س - ٣))^{٢} = ٣٦$

$\frac{٣٦}{٣٦}(ص + ٢)^{٢} + \frac{(س - ٣)^{٢}}{٣٦} = \frac{٣٦}{٣٦}$

$\frac{(ص + ٢)^{٢}}{١٦} + \frac{(س - ٣)^{٢}}{٣٦} = ١$

مركز سطح (٣، -٢)

$ا = ٨$ ، $ب = ٤$

$جـ^{٢} = ٤٨ \Rightarrow جـ = \sqrt{٤٨}$

البؤرتان $(٣ \pm \sqrt{٤٨}, -٢)$

الرأسان $(٣ \pm ٨, -٢)$

$(١١, -٢)(-٥, -٢)$

طول المحور الكبير $= ٢ \times ٨ = ١٦$

طول المحور الصغير $= ٢ \times ٤ = ٨$

$هـ = \frac{جـ}{ا} = \frac{\sqrt{٤٨}}{٨}$

(و) $(٤ س^{٢} + ٣ ص^{٢} = \frac{٤}{٣}) \div \frac{٤}{٣}$

$\frac{٤ س^{٢}}{\frac{٤}{٣}} + \frac{٣ ص^{٢}}{\frac{٤}{٣}} = ١ \Rightarrow \frac{س^{٢}}{\frac{١}{٣}} + \frac{ص^{٢}}{\frac{٤}{٩}} = ١$

القطع ناقص $ا = \frac{٤}{٣}$ ، $ب = \frac{١}{\sqrt{٣}}$ ، $جـ = \sqrt{\frac{٤}{٩} - \frac{١}{٣}} = \sqrt{\frac{١}{٩}} \Rightarrow جـ = \frac{١}{٣}$

المركز $(٠, ٠)$ ، البؤرتان $(٠, \pm \frac{١}{٣})$ ، الرأسان $(٠, \pm \frac{٤}{٣})$

طول المحور الكبير $= ٢ \times \frac{٤}{٣} = \frac{٨}{٣}$

طول المحور الصغير $= ٢ \times \frac{١}{\sqrt{٣}} = \frac{٢}{\sqrt{٣}}$

$هـ = \frac{جـ}{ا} = \frac{\frac{١}{٣}}{\frac{٤}{٣}} = \frac{١}{٤}$

(١٩)

(ب) $\frac{(س-٤)^2}{٥٥} + \frac{(ص+١)^2}{١٨} = ١$

الحل: قطع ناقص $أ = ٩$ ، $ب = ٥$

المركز $(٤، -١)$

$جـ^2 = ١٨ - ٥٥ = ٥٦$

$جـ = \sqrt{٥٦}$

البؤرتان $(٤، -١ \pm \sqrt{٥٦})$

الرأسان $(٤، -١ \pm ٩)$

$(٤، ٨)$ ، $(٤، -١٠)$

طول الأكبر ١٨

$=$ الأصغر ١٠

الاختلاف المركزي $هـ = \frac{جـ}{أ} = \frac{\sqrt{٥٦}}{٩}$

(ج) $س^2 + ٤ص^2 = ١٠٠ \div ١٠٠$

$\frac{س^2}{١٠٠} + \frac{ص^2}{٢٥} = ١$

قطع ناقص مركز $(٠، ٠)$

$أ = ١٠$ ، $ب = ٥$

$جـ^2 = ١٠٠ - ٢٥ = ٧٥$

$جـ = \sqrt{٧٥}$

الرأسان $(\pm ١٠، ٠)$

البؤرتان $(\pm \sqrt{٧٥}، ٠)$

طول المحور الأكبر $= ٢٠$

$=$ $=$ الأصغر $= ١٠$

الاختلاف المركزي $هـ = \frac{\sqrt{٧٥}}{١٠}$

(د) $س^2 + ٦ص^2 + ٤ص = ٦س - ٧$

$س^2 - ٦س + ٦ص^2 + ٤ص = -٧$

$(س-٣)^2 + ٦(ص^2 + \frac{٤}{٦}ص) = -٧ + ٩$

$(س-٣)^2 + ٦(ص+١)^2 = ٢ + ٦ \div ٦$

$\frac{(س-٣)^2}{٦} + \frac{(ص+١)^2}{١} = ١$

مركز $(٣، -١)$ شبه

$أ = ٦$ ، $ب = ١$

$جـ^2 = ٦ - ١ = ٥$ $\Rightarrow$ $جـ = \sqrt{٥}$

البؤرتان $(٣ \pm \sqrt{٥}، -١)$

الرأسان $(٣ \pm \sqrt{٦}، -١)$

$(٥، -١)$ $(١، -١)$

طول الأكبر $= ٤$

طول الأصغر $= ٢\sqrt{٥}$

$هـ = \frac{\sqrt{٥}}{٢}$

(أ) نهايتا محوره الأصغر $(\pm 3, 0)$ ويمر بالنقطة $(3, \frac{4}{5})$

الحل: $2b = 6 \Leftarrow b = 3$ ← $(\frac{\pm 3 - 2}{c}, \frac{-0}{c})$

المركز منتصف المسافة $= (0, 0)$

$$\frac{س^2}{9} + \frac{ص^2}{ف^2} = 1$$

بالتعويض $(3, \frac{4}{5}) \Leftarrow \frac{4}{9} + \frac{9}{ف^2} = 1$

$$\frac{9ف^2 + 16}{9ف^2} = 1 \Leftarrow 4ف^2 + 16 = 9ف^2$$

$$9ف^2 - 4ف^2 - 16 = 0 \Leftarrow 5ف^2 = 16$$

$$ف^2 = \frac{16}{5}$$

المعادلة هي $\frac{س^2}{9} + \frac{ص^2}{\frac{16}{5}} = 1$

السؤال الثاني: جد عناصر القطع

(ب) $\frac{س^2}{144} + \frac{ص^2}{25} = 1$

الحل: قطع سيني $أ = 12$، $ب = 5$

$جـ^2 = 144 - 25 = 119$، $جـ = \sqrt{119}$

المركز $(0, 0)$

الرأسان $(\pm 12, 0)$

البؤرتان $(\pm \sqrt{119}, 0)$

طول المحور الأكبر $= 2 \times 12 = 24$،

طول المحور الأصغر $= 2 \times 5 = 10$

الاختلاف المركزي هو $= \frac{جـ}{أ} = \frac{\sqrt{119}}{12}$

(١٧)

(هـ) يمس النقطة (-٨، ٣) ويقع مركزه على المستقيم س = ٢ ويقطع ٥ ، نقطتان على المستقيم ص = ٣ ، أطوال الوتر المشترك = ٨



قطع ناقص سنتر

$$\frac{(س-د)^2}{ب^2} + \frac{(ص-هـ)^2}{ب^2} = ١$$

المركز هو نقطة تقاطع المستقيم س = ٢ مع المستقيم ص = ٣ ⇐ المركز (٢، ٣)

النقطة (-٨، ٣) هي الرأس

المسافة من الرأس لأقرب مركز = أ ⇐ ١٠ = |-٨ - ٢| = أ

$$\frac{جـ}{أ} = \frac{٦}{١٠} \Leftarrow \frac{جـ}{١٠} = \frac{٦}{١٠} \Leftarrow جـ = ٦$$

$$ب^2 = أ^2 - جـ^2 \Leftarrow ب^2 = أ^2 - جـ^2$$

$$ب^2 = ١٠٠ - ٣٦ = ٦٤ \Leftarrow ب^2 = ٦٤$$

المعادلة هي $\frac{(س-٢)^2}{١٠٠} + \frac{(ص-٣)^2}{٦٤} = ١$

(و) رأساه (٠، ٥) ، (٠، -٨) طول محوره الأصغر يساوي (٤) أمثال المسافة بين أحد رأسيه والبؤرة القريبة منه ذلك الرأس

الحل: المركز منتصف المسافة بين الرأسين = $(\frac{٠+٠}{٢}, \frac{٥-٨}{٢}) = (٠، -\frac{٣}{٢})$

المسافة بين الرأسين ٢أ = |٥ - (-٨)| = ١٣ ⇐ أ = $\frac{١٣}{٢}$

طول محوره الأصغر = (٤) أمثال المسافة بين أحد رأسيه والبؤرة القريبة.

$ب^2 = ٤(أ - جـ)$ ، $ب = ٢(أ - جـ)$ ⇐ $ب = ١٣ - ٢جـ$

$جـ^2 = أ^2 - ب^2$ ⇐ $جـ^2 = ٢٥ - (١٣ - ٢جـ)^2$ ⇐ $جـ^2 = ٢٥ - ١٦٩ + ٥٢جـ - ٤جـ^2$

$٥جـ^2 - ٥٢جـ + ١٤٤ = ٠$ ÷ ١ ⇐ $جـ^2 - ١٠جـ + ٢٨ = (جـ - ٣)(جـ - ٧)$

جـ = ٣ ، جـ = ٧ مرفوضة لأن أ = ٥ ⇐ $ب = ٢(٥ - ٣) = ٤$

$\frac{(ص-٣)^2}{٢٥} + \frac{(س+٣)^2}{١٦} = ١$

(16)

⑤ مركز ، نقطة الاصل ، محور الاكبر يوازي محور السينات وبعدها عن النقطة (٣،١) واختلافه المركزي ٥،٠

الحل : معادلة القطع الناقص الذي محوره الأكبر يوازي محور السينات ⇐ $\frac{(س-ا)^2}{ب^2} + \frac{(ص-ب)^2}{ب^2} = 1$

اختلافه المركزي $= هـ = \frac{جـ}{ا} = \frac{1}{2} \Leftarrow$ $\boxed{ا = 2 جـ}$

بعدها عن النقطة (٣،١) $\Leftarrow$ $\frac{(س-ا)^2}{ا^2} + \frac{(ص-ب)^2}{ب^2} = 1$ وهو معطى

$\frac{ب^2 + 9 جـ^2}{ا^2 ب^2} = 1 \Leftarrow$ $\boxed{ا^2 ب^2 = ب^2 + 9 جـ^2}$ ①

$\Leftarrow$ $جـ^2 = ا^2 - ب^2$ ، $جـ = \frac{1}{2} ا$

$\frac{1}{4} ا^2 = ا^2 - ب^2 \Leftarrow ب^2 = ا^2 - \frac{1}{4} ا^2$ ... ② وهو معطى

$\boxed{ب^2 = \frac{3}{4} ا^2}$ ① عوض هنا في

$4 \times \left(ا^2 \times \frac{3}{4} ا^2 = \frac{3}{4} ا^2 + 9 ا^2 \right)$

$3 ا^4 = 3 ا^2 + 36 ا^2$

$3 ا^4 = 39 ا^2$ ÷ ٣

$ا^4 - 13 ا^2 = 0$

$ا^2 (ا^2 - 13) = 0 \Leftarrow ا^2 = 0 \Leftarrow ا = 0$

$ا^2 - 13 = 0$

$ا^2 = 13$

$ا = \pm \sqrt{13}$ ↘ ٣

$\boxed{ا = \sqrt{13}}$

$ب^2 = \frac{3}{4} \times 13 = \frac{39}{4} \Leftarrow \boxed{ب^2 = \frac{39}{4}}$

المعادلة هي $\frac{س^2}{13} + \frac{ص^2}{\frac{39}{4}} = 1$

(١٥)

(ب) مركز نقطة الأصل وإحداثاه تحقق المعادلتين وبعده البؤرة ٦ وحدات

الفترة بين طولي محوريه = ٢ وحدات

الحل: ٢جـ = ٦ ⇐ جـ = ٣ ⇐ الفترة بين طولي محوريه

٢أ - ٢ب = ٢ ⇐ طول الأكبر = ٢أ

طول الأصغر = ٢ب

الفترة ٢أ - ٢ب = ٢

أ - ب = ١

أ = ب + ١

جـ٢ = أ٢ - ب٢

٩ = (ب + ١)٢ - ب٢

٩ = ب٢ + ٢ب + ١ - ب٢

٨ = ٢ب ⇐ ب = ٤

أ = ب + ١ = ٥

مركز (٠،٠)

$\frac{س^2}{ص^2} + \frac{ص^2}{16} = 1$



تمارين ومسائل القطع الناقص - ٢٥٨

① حد معادلة القطع الناقص ثم ارسم شكله ثم عين:

(أ) رأسا التقعران (٤، ١) (-٢، ١) وطول محوره الاصغر ٤ وحدات

المركز منتصف المسافة بين الرأسان $\left(\frac{س_1+س_2}{2}, \frac{ص_1+ص_2}{2}\right)$

$$\left(\frac{4-2}{2}, \frac{1+1}{2}\right) = (1, 1)$$

$ب$ = المسافة من المركز الى احد الرأسين $= 4-1 = 3$

$ب$ = طول المحور الاصغر $ب = 4 \Leftarrow ب = 2$

المعادلة هي $\frac{(س-1)^2}{9} + \frac{(ص-1)^2}{4} = 1$

(ب) بؤرتان $(0, \pm 2)$، رأسان $(0, \pm 5)$



الحل: المركز $\left(\frac{0+0}{2}, \frac{2+(-2)}{2}\right) = (0, 0)$



$ا$ = ٥ المسافة من المركز الى احد الرأسين

$جـ$ = ٢ المسافة من المركز الى احد البؤرتين

$ا^2 = ب^2 + جـ^2 \Leftarrow ب^2 = 25 - 4 = 21$

$$\frac{ص^2}{25} + \frac{س^2}{21} = 1$$

تدريب ٦ ص ٣٥٦ قطع ناقص معادلته $٤س^٢ + ٣ص^٢ + ١٦س = ١٧٦$

جد ① مركز ② الرأسين ③ البؤرتين ④ الاختلاف المركزي

الحل: $٤س^٢ + ١٦س + ٣ص^٢ = ١٧٦$

$٤(س^٢ + ٤س) + ٣ص^٢ = ١٧٦$

$٤(س^٢ + ٤س + ٤) + ٣ص^٢ = ١٧٦ + ١٦$

$\frac{٤(س+٢)^٢}{١٩٢} + \frac{٣ص^٢}{١٩٢} = \frac{١٩٢}{١٩٢}$ ← لازم يكون 1

$\frac{(س+٢)^٢}{٤٨} + \frac{ص^٢}{٦٤} = ١$

$ج^٢ = ٦٤ \Leftarrow ج = ٨$

$ب^٢ = ٤٨ \Leftarrow ب = ٤\sqrt{٣}$

$ج^٢ = ا^٢ - ب^٢$

$= ٦٤ - ٤٨ = ١٦$

$\therefore ا = ٤$

المركز $(-٢، ٠)$

الرأسان $(-٢، \pm ٨)$

البؤرتان $(-٢، \pm ٤)$

الاختلاف المركزي

$هـ = \frac{ج}{ا} = \frac{٤}{٨} = ٠.٥$

مساحة القطع الناقص الذي معادلته $\frac{س^٢}{ا^٢} + \frac{ص^٢}{ب^٢} = ١$

$= ا ب \pi$

مثال ٥ ص ٣٥٧ جد مساحة القطع الناقص الذي معادلته $\frac{س^٢}{١٢١} + \frac{ص^٢}{٩} = ١$

الحل: $ا = ١١، \quad ب = ٣$

$م = ا ب \pi = ١١ \times ٣ \times \frac{٢٢}{٧} = \frac{٧٢٦}{٧}$ وحدة مساحة

مثال 5 / ٣٥٦ حدد عناصر القطع الناقص الذي معادلته

$س^2 + ١٠ص^2 - ٦س - ٤٠ص - ١١ = ٠$

الحل: $س^2 - ٦س + ١٠ص^2 - ٤٠ص = ١١$

$ك^2 - ٦س + ١٠(ص^2 - ٤ص) = ١١$

اكمال مربع س و اكمال مربع ص

$س^2 - ٦س + ٩ + ١٠(ص^2 - ٤ص + ٤) = ١١ + ٩ + ٤٠$

$(س-٣)^2 + ١٠(ص-٢)^2 = ٦٠$ دائماً يجب ان يساوي ١

نقسم على ٦٠

$\frac{(س-٣)^2}{٦٠} + \frac{١٠(ص-٢)^2}{٦٠} = ١$

$\frac{(س-٣)^2}{٦٠} + \frac{(ص-٢)^2}{٦} = ١$

$أ^2 = ٦٠ \Rightarrow أ = \sqrt{٦٠}$

$ب^2 = ٦ \Rightarrow ب = \sqrt{٦}$

$أ^2 = ب^2 + جـ^2$

$٦٠ = ٦ + جـ^2$

$جـ^2 = ٥٤$

$جـ = \sqrt{٥٤} = \sqrt{٩ \times ٦} = ٣\sqrt{٦}$

المركز $(٣، ٢)$ البعد البؤري $= ٢جـ = ٢ \times ٣\sqrt{٦}$

البؤرتان $(ك \pm جـ، هـ) = (٣ \pm ٣\sqrt{٦}، ٢)$،

الرأسان $(ك \pm أ، هـ) = (٣ \pm \sqrt{٦٠}، ٢)$ طول المحور الأكبر $٢أ = ٢\sqrt{٦٠}$

طرفا المرافقة $= (ك، هـ \pm ب) = (٣، ٢ \pm \sqrt{٦})$

طول $\overline{ب ب} = ٢\sqrt{٦}$

تدريب ٥

(١١)

عين معادلة القطع الناقص الذي يمس المستقيمات

$س = ٨ ، س = -٢ ، ص = ٩ ، ص = ١$



$ب^٢ = ١٠$

$ب = ٥$

مركز $= \frac{-٢ + ٨}{٢} = ٣$ = س المركز

$أ = ٩ - ١ = ٨$

$أ^٢ = ٦٤$

$أ = ٤$

المركز ص $= \frac{٩ + ١}{٢} = ٥$

المركز $(٣، ٥)$

$ج^٢ = أ^٢ + ب^٢$

$ج^٢ = ١٦ - ٢٥ = -٩$

المعادلة هي $\frac{(س - ٣)^٢}{٢٥} + \frac{(ص - ٥)^٢}{١٦} = ١$

الصورة العامة لمعادلة القطع الناقص هي

$أ س^٢ + ب ص^٢ + ج س + د ص + هـ = ٠$

$أ ، ب ، هـ \in ح$

$أ \times ب > ٠ ، أ \neq ب$

تدريب ٤ جد معادلة القطع الناقص الذي بؤرتاه (٤، ١) و (٤، ٥) والمؤثر المقابل (٤، ١) اعلاه المركز ٥٠.

الحل: القطع سيني



$$\frac{(س - د)^2}{ب^2} + \frac{(ص - هـ)^2}{ب^2} = ١$$

$$ب - ج = ٢$$

$$هـ = \frac{ج}{ب} \Leftarrow ٠ = \frac{ج}{ب} \Leftarrow ج = ٥ \Leftarrow ب = ٥$$

$$ب = ٢ج$$

$$ج - ب = ٢$$

$$ب = ٢ \Leftarrow ب = ٤$$

$$ب^2 = ب^2 + ج^2 \Leftarrow ١٦ - ٤ = ١٢ = ب^2$$

الرأس $(د + ب، هـ)$ $هـ = ١$ لان المحاله على محور توازي محور س

$$(د + ٤، ١) = (١، ٤) \quad هـ = ١$$

$$د + ٤ = ٤ \Leftarrow \boxed{د = ٥}$$ المركز $(٥، ١)$

$$\frac{س^2}{١٦} + \frac{ص^2}{١٢} = ١$$

(٩)

مثال ٤ جد بؤرتي وحدارية القطع الناقص الذي رأساه هما (٠،١٥) (٠،-١٥)
واختلافه المركزي ٨٠.

الحل : القطع سيني

المركز $= \left(\frac{٥+-٥}{٢}, \frac{٠+٠}{٢}\right) = (٠،٠)$

$ب = ٥$

$\frac{ج}{أ} = \frac{٨}{١٠} \Leftarrow \frac{ج}{أ} = \frac{٠٫٨}{١} \Leftarrow$ $\boxed{أ = ٤}$

$أ^{٢} = ب^{٢} + ج^{٢} \Leftarrow ٢٥ - ١٦ = ج^{٢} = ٩$

① * المركز (٠،٠)

② الرأسان $(\pm ١٥، ٠)$ طول المحور الأكبر $= ٢أ = ٣٠$

③ البؤرتان $(\pm ٤، ٠)$ البعد البؤري $ج = \pm ٤$

④ المحور الأصغر $(٠، \pm ٦)$ طول $= ٢ب = ١٢$

⑤ المعادلة هي $\frac{س^{٢}}{٢٥} + \frac{ص^{٢}}{٩} = ١$



تدريب ٣ / ٣٥٤ جد عناصر القطع الناقص الذي معادلته

$\frac{س^2}{25} + \frac{ص^2}{9} = 1$ ثم ارسم شكلا تقريبيا.



الحل : القطع سيني المركز (٠،٠)

$أ^2 = 25 \Leftarrow أ = 5$

$ب^2 = 9 \Leftarrow ب = 3$

$ج^2 = أ^2 - ب^2 \Leftarrow ج^2 = 16 \Leftarrow ج = 4$

الرأسان (٥،٠) (-٥،٠)

طول المحور الأكبر $= 2أ = 10$

البؤرتان = (٤،٠) (-٤،٠)

البعد البؤري $= 2ج = 8$

طرفا المحور الأصغر (٠،٣) (٠،-٣)

طول $\overline{ب ب} = 6$

مثال ٣ / ٣ ج ٣

جد عناصر القطع الناقص الذي معادلته

$$\frac{(س+١)^{٢}}{١٦} + \frac{(ص-٢)^{٢}}{٢٥} = ١$$

الحل : القطع ناقص لان $٢٥ = ب^{٢} > ١٦ = أ^{٢}$ البؤرة هي المتغير ص

$$أ^{٢} = ١٦ \Leftarrow أ = ٤$$

$$ب^{٢} = ٢٥ \Leftarrow ب = ٥$$

$$جـ^{٢} = ب^{٢} - أ^{٢} \Leftarrow جـ^{٢} = ٩ \Leftarrow جـ = ٣$$

① مركز $(ك ، هـ) = (-١ ، ٢)$

② رؤوسا $(ك ، هـ \pm ب) = (-١ ، -١)$
$(-١ ، ٥)$

③ رأسا $(ك ، هـ \pm أ) = (-١ ، ٧)$
$(-١ ، -٣)$



④ المحور الأكبر يوازي محور الصادات

معادلته $س = -١$ ، طوله $= ٢ب = ١٠$

⑤ محور الاصغر يوازي محور السينات

معادلته $ص = ٢$ طوله $= ٢أ = ٨$

طرفا الاصغر $(٢ ، ٣) (-٥ ، ٢)$

(٦)

تدريب ٣٥٣ معادلة القطع الناقص الذي بؤرتاه $(٢، ٠)$ $(-٢، ٠)$ وطول محوره الأكبر ١٢



الحل: القطع ناقص بؤرتاه على محور السينات ومركزه نقطة الأصل

المركز $(٠، ٠)$ ⟸ $ه = ٢$ ⟸ $٢ه = ٦$

المسافة بين البؤرتين = طول المحور الأصغر

$ه^٢ = ا^٢ - ب^٢$

$٤ = ٣٦ - ب^٢$

$ب^٢ = ٣٢$

$\frac{(س - ٦)^٢}{٣٦} + \frac{(ص + ٠)^٢}{٣٢} = ١$

(٥)

جد معادلة القطع الناقص

بؤرتان (٤، ١)، (٠، ١) ويتقاطع معها ٥ مع المحور الأكبر عند س = ٥ جـ + ٢

الحل: البعد بين البؤرتين في الاتجاه السيني = القطع من

$$\frac{(س - د)^2}{ب^2} + \frac{(ص - هـ)^2}{ب^2} = ١$$

البعد بين البؤرتين = ٢ جـ ⇐ ٢ جـ = ٤ ⇐ جـ = ٢

المركز هو منتصف المسافة بين البؤرتين منتصف القطعة الذي طرفاه

$$\left(\frac{س_١ + س_٢}{٢}، \frac{ص_١ + ص_٢}{٢}\right)$$

(د، هـ) ⇐ (٢، ١)

يتقاطع مع المحور الأكبر عند النقطة ٥ جـ + ٢ ⇐ (٥ جـ + ٢، ١)

المسافة من المركز الى الرأس = ب

$$|٢ - (٥ جـ + ٢)| = ٥ جـ = ب$$

$$ب^2 = ب'^2 + جـ^2$$

$$٢٥ = ب'^2 + ٤ ⇐ ب'^2 = ١$$



المعادلة هي

$$\frac{(س - ٢)^2}{٢٥} + \frac{(ص - ١)^2}{١} = ١$$

تدريب ١ / ص ٣٥٠

جد معادلة القطع الناقص مركزه نقطة الاصل وحدد طول المحور الاصغر يوازي محور الصادات وطوله يساوي ٤ واحدى بؤرتيه النقطة $(-\sqrt{3}, 0)$

مركز $(د، هـ) = (٠، ٠)$

$٢ب = ٤ \Leftarrow ب = ٢$

$جـ = \sqrt{٣} = \sqrt{أ^{٢} - ب^{٢}}$

$أ^{٢} = ب^{٢} + جـ^{٢}$

$= ٤ + ٩ = ١٣$

$\frac{س^{٢}}{١٣} + \frac{ص^{٢}}{٤} = ١$



مثال ٢ / ص ٣٥١

جد معادلة القطع الناقص مركزه $(٢، -١)$ احدى بؤرتيه $(٢، -١)$ طول محوره الاصغر $= ٦$

الحل: $جـ =$ المسافة بين المركز والبؤرة $= |-١ - (-٣)| = ٤$

طول الاصغر $= ٢ب = ٦ \Leftarrow ب = ٣$

$أ^{٢} = ب^{٢} + جـ^{٢} = ٩ + ١٦ = ٢٥$

القطع مواز للمحور $\Leftarrow$ المحور مواز لمحور الصادات

$\frac{(ص - ٣)^{٢}}{٢٥} + \frac{(س - ٢)^{٢}}{٩} = ١$



(٣)

ملاحظات على القطع الناقص

① الاختلاف المركزي هو $\varepsilon = \frac{جـ}{ا} = \frac{\text{بعد البؤرة عن المركز}}{\text{بعد الرأس عن المركز}}$

$\varepsilon < ١$ لأن $جـ < ا$

② في القطع الناقص $ا^{٢} = ب^{٢} + جـ^{٢}$

③ تحكم في القطع ستر أو عمودي تبعاً على المقدار المرتبط مع $ا^{٢}$ الكبرى

④ يمكن كتابة معادلات القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل

١) $ا^{٢}هـ^{٢} + ب^{٢}س^{٢} = ا^{٢}ب^{٢}$ ← ناقص ستر

٢) $ا^{٢}س^{٢} + ب^{٢}هـ^{٢} = ا^{٢}ب^{٢}$ ← ناقص عمودي

مثال ٣٤٩ : جد معادلة القطع الناقص

الحل : القطع ستر

$ا$ = المسافة من المركز الى الرأس

$٩ - ٤ = ٥$

$\boxed{ا = ٥}$

ب من المركز الى الرأس الأصغر

$٦ - ٣ = ٣$ $\boxed{ب = ٣}$



$$\frac{(س - ٤)^{٢}}{٢٥} + \frac{(ص - ٣)^{٢}}{٩} = ١$$

(c)



المركز (٠، ٠)

القطع رأسي ∴ الرأسان والبؤرتان على محور ص

الرأسان (٠، ± ٢ب)

طول المحور الأكبر = ٢ب

رأسا المحور الأصغر (± أ، ٠)

طول = ٢أ

البؤرتان (٠، ± جـ)

البعد البؤري = جـ

المعادلة هي $\frac{\text{ص}^2}{\text{ب}^2} + \frac{\text{س}^2}{\text{أ}^2} = 1$



القطع سنر المركز (ك، هـ)

الرأسان (ك ± ٢أ، هـ)

البؤرتان (ك ± جـ، هـ)

رأسا المحور الأصغر ك، (هـ ± ب)

المعادلة هي $\frac{(\text{س} - \text{ك})^2}{\text{أ}^2} + \frac{(\text{ص} - \text{هـ})^2}{\text{ب}^2} = 1$



المركز (ك، هـ) القطع رأسي

الرأسان (ك، هـ ± ٢ب)

البؤرتان (ك، هـ ± جـ)

رأسا المحور الأصغر (ك ± ب، هـ)

المعادلة هي $\frac{(\text{ص} - \text{هـ})^2}{\text{ب}^2} + \frac{(\text{س} - \text{ك})^2}{\text{أ}^2} = 1$

القطع الناقص

هو المحل الهندسي للنقطة ن (س، ص) التي تتحرك في المستوى الاحداثي بحيث تكون مجموع بعديها عن نقطتين ثابتتين ب، ب، ((البؤرتان)) مساوي مقدارًا ثابتًا.



أ، أ رأسا القطع

البعد بينهما = طول المحور الأكبر = ٢أ

ب، ب المحور الأصغر وطوله = ٢ب

المسافة بين ب، ن = البعد البؤري = ٢هـ

المركز (٠، ٠) القطع سيني

الرأسان (٠، أ) (٠، -أ)

طول المحور الأكبر = ٢أ

رأسا المحور الأصغر (ب، ٠) (-ب، ٠)

طوله = ٢ب



البؤرتان (هـ، ٠) (-هـ، ٠) البعد البؤري = ٢هـ

القطع سيني تعني ان الرأسين والبؤرتين على محور السينات

المعادلة $\frac{س^2}{أ^2} + \frac{ص^2}{ب^2} = 1$