

(6) قيمة هو

$$f(x) = \log_{10}(1 \times 10^{-9}) + \log_{10} 100$$

a) - 7

b) 7

c) 9

d) - 9

(7) مدى الاقتران $f(x) = \log_7 x$ هو :

a) $(0, \infty)$

b) $(-\infty, 0)$

c) $R - \{0\}$

d) R

(8) مجال الاقتران $f(x) = \log(5 - x)$ هو :

a) $(0, \infty)$

b) $(-\infty, 5)$

c) $(0, 5)$

d) $(5, \infty)$

(9) يمثل الشكل الاتي التمثيل البياني لمنحنى


الاقتران $f(x)$ واحدة يمثل قاعدة $f(x)$

a) $f(x) = -\log_2 x$

b) $f(x) = \log_2(-x)$

c) $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$

d) $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(-x)$



• اذا كان $\log_b 3 = 0.71$

$\log_b 2 = 0.41$ ، فأجب عن الفقرتين الآتيتين:

10. قيمة $\log_b 6$ هي:

a) 1.12

b) 0.2911

c) 1.73

d) 4.76

11. قيمة $\log_b \left(\frac{b}{4}\right)$ هي :

a) 1.82

b) - 1.82

c) 0.18

d) - 0.18

(12) أحد التالية يكافئ المقدار $\log_a \frac{ax^5}{y^3}$:

a) $5 \log_a x - 3 \log_a y + 1$

b) $a \log_a x^5 - \log_a y^3 + 1$

c) $5a \log_a x - 3 \log_a y - 1$

d) $1 - 5 \log_a x - 3$

السؤال الأول :

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يلي :

(1) قيمة الاقتران $f(x) = 5(2)^{x-1}$ عندما

$x = 3$ هي :

a) $\frac{1}{4}$

b) $\frac{5}{4}$

c) $\frac{4}{5}$

d) 20

(2) مدى الاقتران $f(x) = -2(4)^x - 2$ هو :

a) $(-\infty, 2)$

b) $(-\infty, -2)$

c) $(2, \infty)$

d) $(-2, \infty)$

(3) المقطع y للاقتران $f(x) = (10)^x - 3$ هو:

a) 2

b) - 2

c) 3

d) - 3

(4) يمثل الشكل الاتي التمثيل البياني لمنحنى



الاقتران $f(x)$ واحدة يمثل قاعدة $f(x)$

a) $f(x) = (2)^{-x}$

b) $f(x) = -(2)^{-x}$

c) $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^{-x}$

d) $f(x) = -\left(\frac{1}{2}\right)^x$

(4) يبلغ عدد المشاركين في مؤتمر طبي 150

شخص هذه السنة وبتوقع زيادة هذا العدد

بنسبة 8 % كل سنة: اكتب اقتران النمو الأسّي

الذي يمثل عدد المشاركين بعد 5 سنة

a) 4.5

b) 220.4

c) 18.1

d) 16.3

(5) يمثل الاقتران $A(t) = 200(0.3)^t$

اقتران النمو الأسّي لعدد الدجاج في مزرعة

دواجن حيث t الزمن بالسنوات , نسبة الاضمحلال

تساوي :

a) 0.3

b) 1.3

c) 1.7

d) 0.7

(20) إذا كانت : $f(x) = (1 - x)^{-4}$

فإن $f'(x)$ تساوي :

- a) $-4(1 - x)^{-5}$ b) $4(1 - x)^{-5}$
c) $-3(1 - x)^{-3}$ d) $3(1 - x)^{-3}$

(21) إذا كانت $f(x) = \sin^7 4x$

فإن $f'(x)$ تساوي :

- a) $7\sin^6 4x \cos 4x$
b) $-7\sin^6 4x \cos 4x$
c) $28\sin^6 4x \cos 4x$
d) $-28\sin^6 4x \cos 4x$

(22) احسب ميل المماس لمنحنى

$$f(x) = \frac{7}{2x+3}, (x = -1)$$

- a) -4 b) -14
c) 8 d) -3

(23) الاحداثي x لنقطة الواقعة على المنحنى

$$f(x) = 4x^2 - 6x + 10$$

التي ميل المماس عندها يساوي 10 :

- a) 2 b) -2 c) 0 d) 1

• يتحرك جسم حسب العلاقة :

$$s(t) = 6t^2 - 2t^3$$

فأجب عن الأسئلة (24 , 25 , 26) :

(24) سرعة الجسم المتجهة بعد $t = 1$:

- a) 1 b) 6 c) 3 d) 4

(25) أوجد اتجاه الحركة عند $t = 5$:

- a) الاتجاه نحو اليمين b) الاتجاه نحو اليسار
c) سكون d) ثابت اتجاه

(26) احسب التسارع عندما $t = 3$:

- a) 24 b) -24 c) 12 d) 2

(13) حل المعادلة الأسية

$$-5e^{-2x} = -15$$

- a) $-\ln 5$ b) $\ln 3$
c) $-\frac{\ln 3}{2}$ d) $\frac{\ln 3}{2}$

(14) حل المعادلة الأسية $5^x = 4$ هو :

- a) $\frac{\log 4}{\log 5}$ b) $\frac{\log 5}{\log 4}$
c) $\log \frac{4}{5}$ d) $\log \frac{5}{4}$

(15) إذا كان $S(x) = 400\sqrt{x^2 + 7}$ ، فإن

معدل تغير الاقتران S بالنسبة إلى x هو :

- a) $\frac{-400x}{\sqrt{x^2 + 7}}$ b) $\frac{400x}{\sqrt{x^2 + 7}}$
c) $\frac{-x}{\sqrt{x^2 + 7}}$ d) $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 7}}$

(16) إذا كان f, g قابلين للاشتقاق ، وكان :

$$f(2) = -4, f'(2) = 3, g(2) = 5$$

$g'(2) = 1$ فإن قيمة $(fg)'(2)$ تساوي :

- a) 11 b) 3 c) 4 d) 19

• إذا كانت : $g(-2) = 8$

$$g'(-2) = 4, h(5) = -2, h'(5) = 6$$

احسب $f'(5)$ فأجب عن الفقرتين الآتيتين :

(17) احسب قيمة $f(x) = g(h(x))$

- a) 24 b) 4 c) -24 d) 12

(18) احسب قيمة $f(x) = 4(h(x))^2$

- a) 91 b) -96 c) 9 d) 6

(19) إذا كانت $f(x) = e^{\ln(2e+1)}$ ، فإن $f'(1)$

تساوي :

- a) $2e + 1$ b) 2
c) $3e$ d) 0

② قطعة أرض مستطيلة الشكل تقع بجانب نهر ولا يحاط من جهته ، وكان طول السياج 600 m ، فما أبعاد القطعة التي تجعل المساحة أكبر ما يمكن

③ لدى حداد صفيحة معدنية مساحتها $54 m^2$. أراد الحداد أن يصنع منها خزان ماء على شكل متوازي مستطيلات مغلق وأن يكون الخزان مفتوحاً من الأعلى ، وقاعدته مربعة الشكل . جد أبعاد الخزان التي تجعل حجمه أكبر ما يمكن

السؤال الخامس :

① يُمثل الاقتران $S(x) = 150 - 0.5x$ سعر البذلة الرجالية الذي حددته شركة لإنتاج الملابس ، حيث x عدد البدلات المباعة . ويُمثل الاقتران : $C(x) = 4000 + 0.25x^2$ تكلفة إنتاج x بدلة :

- جد اقتران الإيراد
- جد اقتران الربح
- جد عدد البدلات اللازم بيعها لتحقيق أكبر ربح ممكن ، ثم جد أكبر ربح ممكن
- جد سعر البذلة الواحدة الذي يحقق أكبر ربح ممكن

② عند رمي حجر في مسطح مائي ، تتكون موجات دائرية متحدة المركز . إذا كان نصف قطر دائرة يزداد بمعدل 8 cm/s ، فأجد معدل تغير مساحة هذه الدائرة عندما يكون نصف قطرها 10 cm ، علماً بأن العلاقة التي تربط بين مساحة الدائرة (A) ونصف قطرها (r) هي : $A = \pi r^2$

السؤال الثاني :

① بكتيريا : يمثل الاقتران

$$f(x) = 7000 (1.2)^{\frac{x}{12}}$$

البكتيرية في تجربة مخبرية، حيث x الزمن بالساعات :

- جد عدد الخلايا البكتيرية في بداية التجربة
- جد عدد الخلايا البكتيرية بعد 12 ساعة :
- جد كم ساعة يصبح عدد الخلايا البكتيرية 10080 خلية ؟

② استثمر معاذ مبلغ 7000 JD في شركة

بنسبة ربح مركب تبلغ 1.5% وتضاف كل يوم ، جد جملة المبلغ بعد 5 سنوات ؟

③ حل المعادلة الأسية التالية :

$$5e^{3x-1} = 125$$

$$5^{3+2x} = 3^{x-3}$$

السؤال الثالث :

① جد المشتقة $\frac{dy}{dx}$ عند قيمة x المعطاه :

$$y = \sqrt[3]{x^2 + x + 1} + 2x \ln(x + 1), x = 0$$

$$y = 5u^7 + u^3, u = 3x^2 + 9x, x = -1$$

② جد المشتقة $\frac{dy}{dx}$ كل مما يأتي :

$$1) f(x) = (5x - 1)^6 (e^{2x} - x)$$

$$2) f(x) = \frac{3x - 1}{x^2} + \frac{1}{\cos x} + \sin^3 x$$

$$3) f(x) = (\cos 2x) \sqrt[5]{(x^3 + 2x)^6}$$

السؤال الرابع :

① احسب معادلة المماس لمنحنى

$$f(x) = \frac{4}{x+2} \text{ عندما } (x = 0)$$

اطلب الاجابات
على الواتس اب

الاجابات:

D	1
B	2
B	3
C	4
B	4
D	5
A	6
D	7
B	8
D	9
A	10
C	11
A	12
C	13
A	14
B	15
A	16
A	17
B	18
D	19
B	20
C	21
B	22
A	23
B	24
B	25
B	26

AWA231
LEARN 2 BE

@math_mohdawwad  YouTube

@mohdawwad  Instagram

$$\text{Log } 5^{(3+2x)} = 3^{(x-3)} \text{ Log } 3$$

$$(3+2x) \text{ Log } 5 = (x-3) \text{ Log } 3$$

$$3 \text{ Log } 5 + 2x \text{ Log } 5 = x \text{ Log } 3 - 3 \text{ Log } 3$$

$$2x \text{ Log } 5 - x \text{ Log } 3 = -3 \text{ Log } 3 - 3 \text{ Log } 5$$

$$x(2 \text{ Log } 5 - \text{Log } 3) = -3 \text{ Log } 3 - 3 \text{ Log } 5$$

$$x = \frac{-3 \text{ Log } 3 - 3 \text{ Log } 5}{2 \text{ Log } 5 - \text{Log } 3}$$

المقرر الاول

$$7000 (1.01)^{\frac{x}{2}} = 7000 \quad (1)$$

$$f = 7000 (1.2)^{\frac{x}{2}} \quad (2)$$

$$x = 12$$

$$7000 (1.2)^{\frac{12}{2}} = 6231.8$$

$$\frac{10080}{7000} = \frac{7000}{7000} (1.2)^{\frac{x}{2}} \quad (3)$$

$$1.44 = (1.2)^{\frac{x}{2}}$$

$$(1.2)^2 = (1.2)^{\frac{x}{2}}$$

$$2 = \frac{x}{2}$$

$$x = 4$$

رجح مركب:

$$A = p(1 + \frac{r}{n})^{nxt} \quad (2)$$

$$= (7000) (1 + \frac{0.015}{365})^{365 \times 5} = \dots$$

$$\frac{5}{5} e^{3x-1} = \frac{125}{5} \quad (3)$$

$$\ln e^{3x-1} = \ln 25$$

$$3x-1 = \ln 25 + 1$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{\ln 25 + 1}{3}$$

$$x = \frac{\ln 25 + 1}{3}$$

AWA2E
LEARN 2 BE

المقرر الاول / التفاضل

$$① \quad y = \sqrt[3]{x^2 + x + 1} + \frac{2x}{1} \ln(x+1)$$

$$y' = \left(\frac{1}{3}\right) (x^2 + x + 1)^{-\frac{2}{3}} (2x+1) + (2x) \left(\frac{1}{x+1}\right) + \ln(x+1)(2)$$

$$② \quad y = 5u^7 + u^3, \quad u = 3x^2 + 9x$$

استخدم

$$x = -1 \Rightarrow$$

$$u = 3(-1)^2 + 9(-1) \\ = 3 - 9 = -6$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$= (35u^6 + 3u^2) (6x + 9)$$

$$= (35(-6)^6 + 3(-6)^2) (6(-1) + 9)$$

.....

$$② \quad f = \frac{(5x-1)^6}{(1)} \cdot \frac{(e^{2x}-x)}{(2)}$$

$$(5x-1)^6 (2e^{2x}-1) + (e^{2x}-x) (6)(5x-1)^5 (5)$$

$$③ \quad f(x) = \frac{3x-1}{x^2} + \frac{1}{\cos x} + \sin^3 x$$

$\frac{3x-1}{x^2}$ $\frac{1}{\cos x}$ $\sin^3 x$
 قسمة قسمة قوس

$$f' = \frac{(x^2)(3) - (3x-1)(2x)}{(x^2)^2} + \frac{(-1)(-\sin x)}{(\cos x)^2} + (3)(\sin x)^2 (\cos x)$$

$$③ \quad f(x) = (\cos 2x) \sqrt[5]{(x^3+2x)^6}$$

$$f' = (\cos 2x) \left(\frac{6}{5}\right) (x^3+2x)^{\frac{1}{5}} (3x^2+2) + \left(\sqrt[5]{(x^3+2x)^6}\right) (-2\sin 2x)$$

LEARN 2 BE

المطلوب

$$A = x^2 + 4xh$$

$$54 = x^2 + 4xh$$

$$\frac{54 - x^2}{4x} = \frac{4xh}{4x}$$

$$h = \frac{54 - x^2}{4x}$$

جاء

$$V = x^2 h$$

$$V = x^2 \left(\frac{54 - x^2}{4x} \right)$$

$$\frac{1}{4} x (54 - x^2)$$

$$V = \frac{54}{4} x - \frac{1}{4} x^3$$


نقطة

$$\frac{54}{4} - \frac{3}{4} x^2 = 0$$

$$\frac{54}{4} = \frac{3x^2}{4}$$

$$\frac{54}{3} = \frac{3}{3} x^2$$

$$x = \sqrt{18}$$



المطلوب الأول / السؤال

① عند $x=0$

$$f = \frac{4}{x+2}$$

$$f(0) = \frac{4}{2} = 2 \text{ y}$$

$$f' = \frac{-4(1)}{(x+2)^2}$$


$$f'(0) = \frac{-4}{(0+2)^2} = \frac{-4}{4} = -1 \text{ m}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 2 = -1(x - 0)$$

$$y - 2 = -x$$

$$y = -x + 2$$



$$A = xy$$

$$600 = 2y + x$$

$$600 - 2y = x$$

$$A = (600 - 2y)y$$


$$600y - 2y^2$$

نقطة

$$600 - 4y = 0$$

$$\frac{600}{4} = \frac{4y}{4}$$

$$150 = y$$



$$x = 600 - 2y$$

$$= 600 - 2(150)$$

$$600 - 300$$

$$x = 300$$

$$A = xy = 150 \times 150$$

$$(150)(150)$$

المسألة الخامسة / اعترض الأول :-

$$\begin{aligned} \text{سعر } S &= 150 - 0.5x \\ \text{تكلفة } C &= 4000 + 0.25x^2 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{① الإيراد } R &= (S)(x) \\ &= (150 - 0.5x)(x) \\ R &= 150x - 0.5x^2 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{② الربح } P &= R - C \\ &= (150x - 0.5x^2) - (4000 + 0.25x^2) \\ 150x - 0.5x^2 - 4000 - 0.25x^2 \\ \text{منقح } P &= \end{aligned}$$

$$150 - 1x - 0.5x = 0$$

$$150 - 1.5x = 0$$

$$\frac{150}{1.5} = \frac{1.5x}{1.5}$$

$$x = 100$$



$$\begin{aligned} \text{سعر } S &= 150 - 0.5x \end{aligned}$$

$$150 - 0.5(100) = \boxed{100}$$

المسألة السادسة / الأرض (2)

$$A = \pi r^2$$

$$\frac{dA}{dt} = \pi 2r \frac{dr}{dt}$$

$$= \pi 2(10)(8)$$

$$\frac{dA}{dt} = 160\pi$$

السؤال الأول :

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يلي :

(1) أحد التالية هو اقتران أسّي :

$$\begin{array}{ll} a) f(x) = 3x^3 & b) f(x) = \frac{1}{5^x} \\ c) f(x) = \sqrt{x} & d) f(x) = x^{\frac{1}{3}} \end{array}$$

(2) معادلة خط التقارب الأفقي للاقتران


$$f(x) = 2^{-x} + 3 \text{ هي :}$$

$$\begin{array}{ll} a) y = 2 & b) y = 3 \\ c) y = 0 & d) y = -3 \end{array}$$

(3) أحد الاقترانات التالية هو متناقص على مجاله :

$$\begin{array}{ll} a) f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^{-x} & b) f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2x} \\ c) f(x) = (5)^{x+1} & d) f(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^{-x} \end{array}$$

(4) يمثل الشكل الاتي التمثيل البياني لمنحنى



(5) تلوث : في دراسة علمية تناولت درجة تأثير

التلوث في عدد الأسماك التي تعيش في إحدى البحيرات , توصل العلماء إلى أن عدد الأسماك في البحيرة يقل بنسبة % 20 كل سنة : اكتب

اقتران الاضمحلال الأسّي الذي يمثل عدد

الأسماك في البحيرة بعد 3 سنة , علماً بأن

عددها عند بدء الدراسة هو 12000 سمكة

$$\begin{array}{ll} a) 6144 & b) 8416 \\ c) 1802 & d) 2612 \end{array}$$

(6) يمثل الاقتران $A(t) = 900(1.23)^t$

اقتران النمو الأسّي لعدد الدجاج في مزرعة

دواجن حيث t الزمن بالسنوات, قيمة عامل النمو

تساوي :

$$\begin{array}{ll} a) 0.23 & b) 1.23 \\ c) 123 & d) 23 \end{array}$$

(7) تكتب الاقتران $\log_b 256 = a$ بالصورة

الأسية :

$$\begin{array}{ll} a) b = a^{256} & b) 256^b = a \\ c) a^b = 256 & d) b^a = 256 \end{array}$$

(8) قيمة اللوغاريتم

$$f(x) = \log_2 \frac{1}{\sqrt[3]{(2)^4}} + \log_a 1 \text{ هو :}$$

$$\begin{array}{llll} a) -\frac{3}{4} & b) \frac{3}{4} & c) \frac{4}{3} & d) -\frac{4}{3} \end{array}$$

(9) مجال الاقتران $f(x) = \log(x + 3)$ هو :

$$\begin{array}{ll} a) (-3, \infty) & b) (-\infty, 3) \\ c) R - \{3\} & d) R \end{array}$$

(10) أي الاقترانات التالية هو متناقص $f(x)$ ؟

$$a) f(x) = -\log_2 \frac{x}{5}$$

$$b) f(x) = \log_2(x)$$

$$c) f(x) = \log_1 \frac{x}{2}$$

$$d) f(x) = \log_1 \left(-\frac{x}{2}\right)$$

(11) مقطع x للاقتران $f(x) = \log_7 x$ هو :

$$\begin{array}{ll} a) x = 0 & b) y = 1 \\ c) x = 1 & d) y = 0 \end{array}$$

(17) إذا كانت $f(x) = \sqrt[3]{x^2} + 12$ فإن $f'(1)$ تساوي :

- a) 1 b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{5}{2}$

(18) إذا كان $f(x)$ اقتران قابلاً للاشتقاق عند

$$f'(3) = 4, f(3) = -5, x = 3$$

$g(x) = x^3 f(x)$ فإن $g'(3)$ تساوي :

- a) -27 b) 27 c) -243 d) 243

(19) إذا كان f, g قابلين للاشتقاق , وكان

$$f(2) = 2, f'(2) = -3$$

$g(2) = 6, g'(2) = 9$ فإن :

ما قيمة مشتقة $\left(\frac{f}{g}\right)'(2)$ ؟

- a) 36 b) -36 c) -3 d) -1

(20) إذا كان $f(x) = e^{x^3} \ln x$ فإن $f'(1)$ تساوي :

- a) 2 b) 7 c) $\ln 2$ d) e

(21) $f(x) = \sin e^{2x}$ فإن $f'(x)$ تساوي :

- a) $2e^{2x} \cos e^{2x}$ b) $e^{2x} \cos e^{2x}$
c) $2e^{2x} \sin e^{2x}$ d) $e^{2x} \cos e^x$

(22) $f(x) = \ln \sin 3x$ فإن $f'(x)$ تساوي :

- a) $\frac{3 \cos 3x}{\sin 3x}$ b) $\ln \cos 3x$
c) $\frac{\cos 3x}{\sin 3x}$ d) $\frac{3 \sin 3x}{\cos 3x}$

(12) أحد التالية يكافئ المقدار

$$\log_a 64 - \log_a 16 + \log_a 4$$

- a) $\log_a 4$ b) $\log_a 32$
c) $\log_a 16$ d) $\log_a 64$

(13) يمثل الاقتران

$$M(t) = 92 - 28 \log_{10}(t + 1)$$

المئوية للموضوعات التي يتذكرها الطالب من

ماده معينه بعد t شهرا من انهاء دراستها

جد النسبة المئوية للموضوعات التي يتذكرها

هذا الطالب بعد 29 شهرا من انهاء دراسة

المادة :

- a) 51.6 b) 50.5 c) 53.5 d) 55.5

(14) إذا كانت $\log_a 4 = k$, احسب $\log_a 16$

بدلالة k :

- a) $\frac{k}{4}$ b) $2k$ c) k d) $4k$

(15) إذا كانت $e^{x^2} = 1$ فإن قيمة x هي :

- a) 0 b) 2 c) 4 d) 1

(16) حل المعادلة الاسية $2^{x+4} = 5^{3x}$ هو :

- a) $\frac{4 \log 2}{3 \log 5 + \log 2}$
b) $\frac{-4 \log 2}{\log 2 + 3 \log 5}$
c) $\frac{4 \log 2}{3 \log 5 - \log 2}$
d) $\frac{-4 \log 2}{-3 \log 5 - \log 2}$

يمكن تغيير اشارة
الحل كامل

ما ، فإن الايراد الحدي الناتج من بيع x وحدة يساوي :

- a) $2x^2 + 50x$ b) $x^2 + 50$
c) $2x^2 + 50x$ d) $2x + 50$

• إذا كان $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$ أجب عن الفرعين 29 + 30 :

(29) قيمة x التي عندها قيمة عظمى محلية للاقتران f هي :


- a) -5 b) -1 c) 0 d) 2

(30) القيمة الصغرى المحلية للاقتران f هي :

- a) -5 b) -1 c) 0 d) 2

السؤال الثاني :

(a) معتمدا الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الاقتران f ، أجب عن كل مما يأتي :



① بين إذا كان $f(x)$ اقتران أسي أم

لوغاريتمي

② جد مجال ومدى

الاقتران f

③ جد خطوط التقارب للاقتران (إن وجدت)

④ بين إذا كان الاقتران f متزايدا أم متناقصا

(b) إذا كان : $f(x) = 2^{-x}$ فأجب عن كل مما يأتي :

① أكمل جدول القيم الآتية :

x	-2	—	0	1	—
$y = f(x)$	—	2	—	—	$\frac{1}{4}$

② مثل الاقتران f بيانيا مستعينا بالجدول أعلاه

(c) إذا كان : $\log_a x = 4$, $\log_a y = 3$,

فجد كلا مما يأتي :

(23) احسب ميل العمودي على المماس

لمنحنى : $f(x) = \ln(x^2 + 3)$, $(x = 1)$

- a) $-\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) 2 d) -2

(24) إذا كان $f(x)$ اقترانا متصلا ، حيث

$$f(0) = 1, f'(0) = 0$$

فإن معادلة المماس عندما $x = 0$

- a) $y = 1$ b) $y = -1$

- a) $x = 1$ b) $x = -1$

(25) إذا علمت أن $f(x) = x^2 - 16x$ ، فما

قيمة x التي يكون فيها للمنحنى مماس

موازيا لمحور x :

- a) 0 b) 16 c) -8 d) 8

(26) استعمل اختبار المشتقة الثانية لإيجاد

القيم القصوى المحلية (إن وجدت) :

$$f(x) = 2x^2 + 4x - 3$$


- a) $f(0) = -5$ b) $f(-1) = -5$

- c) $f(1) = 2$ d) $f(1) = -5$

(27) يبين الشكل المجاور منحنى الاقتران :

$$f(x) = x^2 - 5x + 3$$

عند النقطة p تساوي :



- a) $y = 1 - x$

- b) $y = x - 1$

- c) $y = x - 2$

- b) $y = 2 - x$

(28) إذا كان اقتران الايراد الكلي للمبيعات في

$$R(x) = x^2 + 50x$$

احدى الشركات هو : حيث x عدد الوحدات المنتجة من سلعة

دينارا ،

① يمثل الاقتران

$$S(t) = 2t^3 - 6t^2 + 8t, t \geq 0$$

جسيم يتحرك في مسار مستقيم، حيث S

الموقع بالأمتار، و t الزمن بالثواني، فإن

سرعة الجسيم المتجهة عندما يكون تسارعه صفراً؟

② أرادت إحدى الشركات أن تصنع خزانات من

الفولاذ الرقيق المقاوم للصدأ على شكل

متوازي مستطيلات بحيث يكون كل منهما

مفتوحاً من الأعلى، وحجمه 32 m^3 ،

وقاعدته مربعة الشكل. جد الأبعاد التي تجعل

مساحة سطح الخزان أقل ما يمكن

③ خطط مزارع لتسييج حظيرة مستطيلة الشكل


قرب نهر كما في الشكل التالي، وحدد مساحة

الحظيرة بـ 100 m^2 لتوفير كمية عشب كافية

لأغنامه. جد أبعاد الحظيرة التي تجعل طول

السياج أقل ما يمكن، علماً بأن الجزء المقابل

للنهر لا يحتاج إلى تسييج



السؤال الخامس:



① $\log_a xy$

② $\log_a x^3$

③ $\log_a \sqrt{y}$

④ $\log_a \left(\frac{y}{x}\right)^2$

(d) استثمر خالد مبلغ 3500 دينار بربح مركب

بفائدة 2.5 % تضاف كل شهرين، أوجد جملة

المبلغ بعد 4 سنوات

(e) حل المعادلات الأسية الآتية :

$$11^{3+2x} = 5^x$$

$$49^x + 7^x - 72 = 0$$

السؤال الثالث:

① جد المشتقة $\frac{dy}{dx}$ عند قيمة x المعطاه :

1. $p(t) = \left(t^{\frac{1}{4}} + 3\right)^3, x = 16$

2. $y = 4\sqrt[3]{(x^2 + 7)} + 2xe^{2-2x}, x = 1$

② جد المشتقة $\frac{dy}{dx}$ كل مما يأتي :

1) $y = e^{1-2x} + \cos^6 2x$

2) $y = \sqrt{u-1}, u = 6 \sin x$

3. $f(x) = \sin^2 3x - \frac{5}{\cos x}$

4. $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) + \ln(3x^2 + 2x)$

السؤال الرابع:



B	1
B	2
D	3
D	4
A	5
B	6
D	7
D	8
A	9
C	10
C	11
C	12
A	13
B	14
A	15
C	16
B	17
A	18
D	19
D	20
A	21
A	22
B	23
A	24
D	25
B	26
A	27
D	28
C	29
A	30

① نفخت هديل بالونًا على شكل كرة ,

فازداد نصف قطرها بمعدل 3 cm/s أجد

معدل تغير البالون عندما يكون نصف قطره 4

cm , علماً بأن العلاقة التي تربط بين حجم

البالون (v) ونصف قطره (r) هي : $v =$

$$\frac{4}{3}\pi r^3$$

② احسب $\frac{dy}{dx}$, $5x^2 - 7xy + 3y^2 = 1$,

عند (1, 1)

اطلب اجابات الاسئلة المقالية على الواتس

@math_mohdawwad YouTube

@mohdawwad Instagram

الاجابات:

حل المسألة الثاني / الفصل الأول

① $A = P(1 + \frac{r}{n})^{nt}$
 $= 3500(1 + \frac{0.025}{6})^{6 \times 4}$
 $= \dots$

② $11^{3+2x} = 5^x$
 $\log 11^{3+2x} = \log 5^x$
 $(3+2x) \log 11 = x \log 5$
 $3 \log 11 + 2x \log 11 = x \log 5$
 $3 \log 11 = x \log 5 - 2x \log 11$
 $3 \log 11 = x (\log 5 - 2 \log 11)$
 $x = \frac{3 \log 11}{\log 5 - 2 \log 11}$


$49^x + 7^x - 72 = 0$
 $(7^x + 9)(7^x - 8) = 0$
 لأن
 $7^x = 8$
 $x = \frac{\log 8}{\log 7}$

المسألة الثاني :-

- ① لربنا - يتبع
 ② المجال $(0, \infty)$
 المدى $(-\infty, \infty) = R$
 ③ $x=0$ ~~$x=0$~~

④

x	-2	-1	0	1	2
y	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$



- ① $\log xy = \log x + \log y$
 $4 + 3 = 7$
 ② $\log x^2 = 2 \log x = 2(4) = 8$
 ③ $\log \sqrt{y} = \frac{1}{2} \log y = \frac{1}{2}(3) = \frac{3}{2}$
 ④ $\log \left(\frac{y}{x}\right)^2 =$
 $= 2 \log y - 2 \log x$
 $= 2(3) - 2(4) = 6 - 8 = -2$



السؤال الثالث / المتمر 2 الثاني / الفصل الأول

① اكتب مشتقة $\frac{dy}{dx}$ لكل مما يلي

$$① P = (t^{\frac{1}{4}} + 3)^3$$

$$P' = (3)(t^{\frac{1}{4}} + 3)^2 (\frac{1}{4}t^{-\frac{3}{4}})$$

② $y = 4\sqrt[3]{(x^2 + x)} + 2xe^{2-x}$

$$y' = (4)(\frac{1}{3})(x^2 + x)^{-\frac{2}{3}}(2x) + 2x(-1)e^{2-x} + (e^{2-x})(2)$$

$x=1$

② ① $y = e^{1-2x} + \cos^6 2x$

$$\therefore y' = (-2)(e^{1-2x}) + (6)(\cos 2x)^5(-2)\sin 2x$$

② $y = \sqrt{u-1}$, $u = 6 \sin x$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\left(\frac{1}{2\sqrt{u-1}}\right)(6 \cos x)$$

$$\left(\frac{1}{2\sqrt{6 \sin x - 1}}\right)(6 \cos x)$$

③ $P = \sin^2 3x - \frac{5}{\cos x}$

$$P' = (2)(\sin 3x)(\cos 3x) + \frac{5(\sin x)}{(\cos x)^2}$$

④ $f = \sin\left(\frac{1}{x}\right) + \ln(3x^2 + 2x)$

$$f' = \left(-\frac{1}{x^2}\right)\left(\cos \frac{1}{x}\right) + \frac{6x + 2}{3x^2 + 2x}$$

LEARN 2 BE

①

$$\begin{aligned} s &= 2t^3 - 6t^2 + 8t \\ v &= 6t^2 - 12t + 8 \\ a &= 12t - 12 \end{aligned}$$

$v = ? \quad / \quad a = 0$

$$\begin{array}{l|l} v(1) = 6(1)^2 - 12(1) + 8 & 12t - 12 = 0 \\ 6 - 12 + 8 & \frac{12t}{12} = \frac{12}{12} \\ -6 + 8 & \boxed{t = 1} \\ = 2 & \end{array}$$

②

$$\begin{aligned} V &= 32 \\ 32 &= x^2 h \end{aligned}$$

$$\boxed{h = \frac{32}{x^2}}$$

$$A = x^2 + 4x(h)$$

$$A = x^2 + 4x\left(\frac{32}{x^2}\right)$$


$$A = x^2 + \frac{128}{x}$$

$$A' = 2x - \frac{128}{x^2} = 0$$

$$\frac{2x}{1} = \frac{128}{x^2} \Rightarrow x^3 = 64$$

$$x = 4$$

$$h = 2$$



③

$$A = 100$$

$$xy = \frac{100}{x}$$

$$\boxed{y = \frac{100}{x}}$$

$$C = 2x + (y)$$

$$C = 2x + \frac{100}{x}$$

$$C' = 2 - \frac{100}{x^2} = 0$$


$$\frac{2}{1} = \frac{100}{x^2}$$

$$\frac{2}{2} x^2 = \frac{100}{2}$$

$$x^2 = 50$$

$$x = \sqrt{50}$$

$$y = \sqrt{50}$$



AWAZ21
LEARN 2 BE

السؤال الأول :

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل

مما يلي :

(1) مجال الاقتران $f(x) = -2(4)^x - 2$ هو :

a) $(-\infty, 0)$

b) R

c) $(0, \infty)$

d) $(-2, \infty)$

(2) أحد الاقترانات التالية يعد اقتران متزايد :

a) $f(x) = \frac{1}{2}(2)^{-x} - 5$

b) $f(x) = \frac{1}{2}(2)^{-x} + 5$

c) $f(x) = 2\left(\frac{1}{4}\right)^x$

d) $f(x) = -2\left(\frac{1}{2}\right)^{x+13}$

(3) مدى الاقتران $f(x) = 2^{-x} + 3$ للاقتران

هو :

a) $(3, \infty)$

b) $(-\infty, -3)$

c) $(-3, \infty)$

d) $(-\infty, 3)$

(4) إذا كانت $f(x) = ab^x$ فإن قيمة $\frac{f(x+1)}{f(x-1)}$

هو :

a) 1

b) b^3

c) b^2

d) b

(5) أودع شخص مبلغ 2000 دينار في حساب

بنكي بنسبة ربح مركب ستمر 2 % ، احسب

جملة المبلغ بعد 6 سنوات :

a) $2000e^{0.02}$

b) $2000e^6$

c) $2000e^{\frac{0.02}{6}}$

d) $2000e^{0.12}$

(6) استثمرت تهاني مبلغ JD 15000 في

شركة ، بنسبة ربح مركب تبلغ 2.25 % ، وتضاف

كل 6 أشهر ، جد جملة المبلغ بعد 5 سنوات

a) 16775.5

b) 1676

c) 16755

d) 1678

(7) المعادلة الأسية $5^{-3} = 0.008$ تكتب

بصورة اللوغاريتم :

a) $\log_5 0.008 = -3$

b) $\log_5 -3 = 0.008$

c) $\log_5 0.0008 = -3$

d) $\log_3 5 = 0.008$

(8) خط التقارب الرأسي للاقتران $f(x) =$

$\log_{\frac{2}{7}} x$ هو :

a) $x = 0$

b) $x = 7$

c) $x = -2$

d) $x = 2$

(9) $\log_7 \sqrt{7} + 2 \log 1 + \log_2 2$ يساوي :

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{5}{2}$

c) $\frac{7}{2}$

d) $\frac{3}{2}$

(10) الاقترانات الأسية في صورة

$f(x) = \log_a b$ حيث a, b عدد حقيقي ،

$a \neq 1, b, a > 0$ تمر جميع منحنياتها

بالنقطة :

a) $(0, 1)$

b) $(0, 0)$

c) $(1, 1)$

d) $(1, 0)$

(11) مجال الاقتران

$f(x) = \log_7(x^2 - x - 2)$ هو :

a) $(-\infty, -1)(2, \infty)$

b) $(-1, 2)$

c) $(-\infty, 1)(-2, \infty)$

d) $(1, -2)$

• إذا كان $\log_b y = 3$

$\log_b x = 4$ ، فأجب عن الفقرتين

الآتيتين :

12. قيمة $\log_b xy$ هي :

a) 12

b) 7

c) 1

d) $\frac{4}{3}$

13. قيمة $\log_b \left(\frac{y}{x}\right)$ هي :

- a) 12 b) -1 c) 1 d) $\frac{4}{3}$

14. أحد التالية يكافئ المقدار $\log_a \sqrt{\frac{x^{12}y^2}{m^3a^2}}$:

- a) $6 \log_a x + \log_a y - \frac{3}{2} \log_a m - 1$
 b) $6 \log_a x + \log_a y - \frac{3}{2} \log_a m + 1$
 c) $6 \log_a x + \log_a y + \frac{3}{2} \log_a m - 1$
 d) $6 \log_a x - \log_a y - \frac{3}{2} \log_a m - 1$

15. حل المعادلة الأسية

$$9^{2x} - 2(9^x) = 0$$

- a) $\frac{\ln 2}{\ln 9}$ b) $-\frac{\ln 9}{\ln 2}$ c) $\frac{\ln 9}{\ln 2}$ d) $-\frac{\ln 2}{\ln 9}$

16. المقدار $\log_4 100$ يكافئ :

- a) $-2 \log 4$ b) $2 \log 4$
 c) $\frac{2}{\log 4}$ d) $-\frac{2}{\log 4}$

17. إذا كانت $f(x) = b^3 x$ بحيث b عدد ثابت

فإن $f'(x)$ تساوي :

- a) $3b^3 x$ b) $3b^3 x$ c) b^3 d) $3b^2$

18. إذا كان $f(x) = g(x)h(x)$ وكان

$g(x), h(x)$ قابلين للاشتقاق , فإن $f'(x)$

- a) $g'(x)h'(x)$ b) $g(x)h'(x) - g'(x)h(x)$
 c) $g'(x) + h'(x)$ d) $g(x)h'(x) + g'(x)h(x)$

19. إذا كانت $f(x) = \frac{7x}{2x-3}$, فإن $f'(x)$

تساوي :

- a) $\frac{-21}{(2x-3)^2}$ b) $\frac{21}{(6x-3)^2}$
 c) $\frac{21}{2x-3}$ d) $\frac{-21}{(2x-3)}$

20. إذا كانت $f(x) = \sin^5 3x$, فإن $f'(x)$

تساوي :

- a) $5\sin^4 3x \cos 3x$
 b) $-5\sin^4 3x \cos 3x$
 c) $15\sin^4 3x \cos 3x$
 d) $-15\sin^4 3x \cos 3x$

21. إذا كان $h(x) = f(g(x))$ حيث

$$f(u) = u^2 - 1 \text{ وكان } g'(2) = -1$$

$$g(2) = 3 \text{ فجد } h'(2)$$

- a) -3 b) 3 c) 6 d) -6

22. إذا كان $f(x) = e^{x^3}$, فإن $f'(x)$ تساوي :

- a) $3x^2 e^x$ b) $3x^2 e^{x^3}$
 c) e^{x^3} d) $3x^2$

23. $f(x) = \frac{\cos x}{1-\sin x}$ فإن $f'(x)$ تساوي :

- a) $\frac{1}{1-\sin x}$ b) $\frac{\cos x}{(1-\sin x)^2}$
 c) $\sin x - 1$ d) $\frac{3-\cos x}{(1-\sin x)^2}$



السؤال الثاني :

(a) إذا كان الاقتران : $f(x) = 3(2)^{x-1} + 5$ فأجب عن كل مما يأتي :

① جد مجال ومدى الاقتران f

② جد خط التقارب الأفقي للاقتران

③ بين إذا كان الاقتران f متزايدا أم متناقصا

(b) إذا كان : $f(x) = \log_3 x$ فأجب عن كل مما يأتي :


① أكمل جدول القيم الآتي :

x	—	$\frac{1}{3}$	—	3	9
$y = f(x)$	-2	—	0	—	—

② مثل الاقتران f بيانيا مستعينا بالجدول أعلاه

(c) يبين الشكل المجاور التمثيل البياني

للمنحنى ، فما قيمة $f(3)$



(d) قيمة الثابت a التي تجعل $f(x) = \log_a x$ يمر $(8, 3)$

(E) يمثل الاقتران

النسبة $M(t) = 10 - 20 \log_6(t + 1)$

المئوية للموضوعات التي يتذكرها الطالب من

ماده معينه بعد t شهرا من انهاء دراستها

جد النسبة المئوية للموضوعات التي يتذكرها

هذا الطالب بعد 11 شهرا من انهاء دراسة

المادة مقربا الإجابة الى أقرب عدد صحيح اذا

علمت ان $\log_6 2 \approx 0.3869$

السؤال الثالث :

(24) إذا علمت أن الاقتران $f(x) = x^2 - 12x$

، فما قيمة x التي يكون منحنى الاقتران f

عندها مماسا موازيا لمحور السينات (أفقياً) ؟

a) 0

b) 12

c) 6

d) - 6

(25) إذا كانت $f(x) = e^{3x} + \ln x$ فإن

$f''(x)$ تساوي :

$$a) f''(x) = 9e^{3x} - \frac{1}{x^2}$$

$$b) f''(x) = 6e^{3x} - \frac{1}{x}$$

$$c) f''(x) = 9e^{3x} - \ln x$$

$$d) f''(x) = 6e^{3x} - \frac{1}{x^2}$$

(26) إذا كان $c(x) = 40 + 3x^2$ اقتران

التكلفة الكلية لإنتاج x قطعة من سلعة ما

هو ، فإن التكلفة الحدية لإنتاج 20 قطعة من

السلعة نفسها هي :

a) 400

b) 160

c) 120

d) 46

(27) إذا كانت $f(x) = ax^2 + x^3 - 8$ وكان

المماس عندما $x = 2$ أفقياً ، فما قيمة a ؟

a) - 3

b) 3

c) 2

d) - 2

معدل زيادة نصف قطر البالون عندما يكون
طول نصف قطره 60cm , علماً بأن العلاقة بين
حجم البالون (v) ونصف قطره (r) هي : $v = \frac{4}{3}\pi r^3$

الاجابات:

B	1
D	2
A	3
C	4
D	5
A	6
A	7
A	8
D	9
D	10
A	11
B	12
B	13
A	14
A	15
C	16
C	17
D	18
A	19
C	20
D	21
B	22
A	23
C	24
A	25
C	26
A	27

@math_mohdawwad YouTube
@mohdawwad



LEARN 2 BE

① جد النقطة التي على منحنى
 $f(x) = x^2 - 5x + 3$ التي يكون المماس
يوازي للمستقيم : $y = 3x + 4$

② تحدّ : إذا مثل الاقتران $s(t) = 2t^3 - 10, t \geq 0$
موقع جسم يتحرك في
مسار مستقيم حيث s الموقع بالأمتار , و t
الزمن بالثواني , فما تسارع الجسم عندما تكون
سرعته صفراً ؟

السؤال الرابع :

① صندوقاً على شكل متوازي مستطيلات. إذا
كانت قاعدة الصندوق مربعة الشكل وطول
ضلع القاعدة $x\text{ cm}$ ومجموع أطوال أحرفه
 144 cm فجد كلاً مما يأتي :
(a) الاقتران الذي يُمثل حجم الصندوق بدلالة x
(b) قيمة x التي تجعل حجم الصندوق أكبر ما
يُمكن

② قطعة ورق مستطيلة الشكل , طولها
 8 cm , عرضها 8 cm , قُص من زوايا القطعة
مربعات متطابقة , طول ضلع كلّ منها $x\text{ cm}$,
كما في الشكل المجاور , ثم ثُنيت لتشكيل
علبة :

(a) جد الاقتران الذي يُمثل حجم العلبة بدلالة x
(b) جد قيمة x التي تجعل حجم العلبة أكبر ما
يُمكن

السؤال الخامس :

① احسب معادلة المماس والعمودي لمنحنى
 $y^3 - 2x^2 = 6x$ عندما $x = 1$
② بالونات : نفخت ماجدة بالوناً على شكل
كرة , فازداد حجمه بمعدل $800\text{cm}^3/\text{s}$. أجد

المقرر الثالث / الفصل الأول

d) $P = \log_a x$

$\log_a 8 = 3$

$a^3 = 8$

$a = \sqrt[3]{8}$

$a = 2$

الأسئلة الثالث

① $P = x^2 - 5x + 3$

$y = 3x + 4$ يوازي

$m_1 = m_2$

$2x - 5 = 3$

$\frac{2}{2}x = \frac{8}{2}$

$x = 4$

$f(4) = (4)^2 - 5(4) + 3$

$16 - 20 + 3 = -1$

$(4, -1)$

② $S = 2t^3 - 24t - 10$

$V = 86t^2 - 24t$

$a = 12t - 24$

$V = 0$

$6t^2 - 24t = 0$

$6t(t - 4) = 0$

$t = 0$

$t = 4$

$a(0) = -24$ | $a(4) = 12(4) - 24$
 $48 - 24 = 24$

الأسئلة الثاني


① المجال $(-\infty, \infty)$

② المدى $(5, \infty)$

③ قطع التقاطع $y = 5$

④ مزايد

x	1/9	1/3	1	3	9
y	-2	-1	0	1	2



$f = ab^{-x}$

$(0, 1) \Rightarrow 1 = ab^0 \Rightarrow a = 1$

$(1, 2) \Rightarrow 2 = ab^{-2}$

$2 = 1b^{-2}$

$\frac{2}{1} \times \frac{1}{b^2}$

$\frac{2}{1} b^2 = \frac{1}{2}$

$b = \sqrt{\frac{1}{2}}$

$f = 1 \left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^{-x}$

$f(3) = \left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^{-3}$

AWA25
LEARN 2 BE

الواجب الرابع / الممتح الثالث / الفصل الاول

① مجموع
الاجزاء = 144

$$\frac{8x}{4} + \frac{4y}{4} = \frac{144}{4}$$

$$2x + y = 36$$

$$y = 36 - 2x$$

الحجم
 $V = x^2 y$

$$V = x^2 (36 - 2x)$$

$$36x^2 - 2x^3$$

$$V' = 72x - 6x^2 = 0$$

$$x(72 - 6x) = 0$$

$$x = 0$$

$$72 - 6x = 0$$

$$72 = 6x$$

$$x = \frac{72}{6}$$



② $V = (8 - 2x)(8 - 2x)(x)$

$$= 4x^3 - 32x^2 + 64x$$

$$\text{مشتقة}, = 0$$


$$12x^2 - 64x + 64 = 0 \quad (\div 4)$$

$$3x^2 - 16x + 16 = 0$$

$$(3x - 4)(x - 4) = 0$$

$$x = \frac{4}{3}$$

$$x = 4$$



الواجب الخامس
الجزء الثاني

① $y^3 - 2x^2 = 6x$, $x = 1$

$$y^3 - 2(1)^2 = 6(1) \Rightarrow y^3 = 8 \Rightarrow y = \sqrt[3]{8}$$

$$\text{نشتق} \quad 3y^2 y' - 4x = 6$$

$$\text{نعوض} \quad 3(2)^2 y' - 4(1) = 6$$

$$12y' - 4 = 6 \rightarrow y' = \frac{10}{12} = \frac{5}{6} \text{ م}$$

$$\text{المماس} \quad y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 2 = \frac{5}{6}(x - 1)$$

$$\text{المعادلة} \quad y - 2 = \frac{5}{6}(x - 1)$$

② $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

$$800 = 4\pi (60)^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{800}{(3600)(4\pi)} = \frac{1}{18\pi}$$